

Информация для пациента
по медицинскому применению лекарственного средства

5008 - 2019

МЕТЕОСПАЗМИЛ

(Листок-вкладыш)

Альверина цитрат/ симетикон

Следует внимательно прочесть данный листок-вкладыш перед началом приема данного лекарственного средства, поскольку в нем содержится важная для Вас информация.

Всегда принимайте данное лекарственное средство так, как указано в данном листке-вкладыше или так, как Вам сказал принимать Ваш врач или фармацевт.

Сохраняйте данный листок-вкладыш до конца приема лекарственного средства, Вам может понадобиться прочитать его еще раз.


При необходимости обратитесь к Вашему врачу или фармацевту за дополнительной информацией.

В случае наличия каких-либо нежелательных реакций сообщите об этом Вашему врачу или фармацевту. Нежелательные реакции могут включать реакции, не указанные в данном листке-вкладыше (См. раздел №4 «Возможные нежелательные реакции»).

Сохраняйте данное лекарственное средство в недоступном для детей месте.

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что такое Метеоспазмил и для чего он применяется
2. Что следует знать перед приемом лекарственного средства Метеоспазмил
3. Как принимать Метеоспазмил
4. Возможные нежелательные реакции
5. Срок годности и условия хранения лекарственного средства Метеоспазмил
6. Содержимое упаковки и другая информация



1. ЧТО ТАКОЕ МЕТЕОСПАЗМИЛ И ДЛЯ ЧЕГО ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ

Метеоспазмил - комбинированный препарат. Оказывает спазмолитическое действие. Уменьшает газообразование в кишечнике.

Предназначен для симптоматического лечения функциональных расстройств кишечника, особенно сопровождающихся метеоризмом.

Применяется для лечения только взрослых пациентов.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие средства для лечения функциональных расстройств кишечника. Альверин, комбинации.

2. ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА МЕТЕОСПАЗМИЛ

Не принимайте Метеоспазмил, если:

- У Вас имеется аллергия на действующие и вспомогательные вещества, перечисленные в разделе 6 «Содержимое упаковки и другая информация».
- У Вас уже была аллергическая реакция при приеме данного средства.
- Если у Вас имеется кишечная непроходимость и/или другие обструктивные нарушения желудочно-кишечного тракта.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Если после двух недель лечения состояние не улучшается или появляются новые симптомы, или имеет место длительный запор, необходимо обратиться к врачу.

Метеоспазмил может повысить уровни печеночных ферментов в крови (см. Раздел 4 «Возможные нежелательные реакции»). Ваш врач может принять решение о назначении анализа крови во время лечения для контроля состояния печени. Повышение уровня печеночных ферментов может привести к тому, что Ваш врач порекомендует прекратить лечение.

Уточните у Вашего врача или фармацевта, если Вы сомневаетесь, стоит ли Вам принимать данное средство.

Лекарственное средство Метеоспазмил нельзя давать детям и подросткам.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Сообщите Вашему врачу или фармацевту, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какое-либо другое лекарственное средство.

Взаимодействие с пищей, напитками или алкоголем

Клинически значимые взаимодействия не выявлены.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ

Беременность

Не рекомендуется применение данного лекарственного средства в период беременности.

Прежде чем принимать какие-либо лекарственные средства, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Если Вы узнаете о наступлении беременности во время лечения, сообщите об этом Вашему врачу, поскольку только врач может принять решение о необходимости продолжения лечения.

Грудное вскармливание

Не рекомендуется применение данного лекарственного средства во время грудного вскармливания.

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И РАБОТА С МЕХАНИЗМАМИ

Препарат может вызывать головокружение. Если отмечается такое побочное действие, не рекомендуется управлять транспортными средствами и другими механизмами.

3. КАК ПРИНИМАТЬ МЕТЕОСПАЗМИЛ

Способ применения и дозы:

Для приема внутрь.

Только для взрослых.

Взрослым: по 1 капсуле 2-3 раза в сутки перед приемом пищи или при наличии боли.

Если Вы приняли больше Метеоспазмилла, чем следовало:


Сообщалось о головокружении при приеме доз, превышающих рекомендованные. Немедленно свяжитесь с Вашим врачом или фармацевтом.

Лечение передозировки альверином: как при отравлении атропином с поддерживающей терапией при гипотензии.

Лечение передозировки симетиконом: симптоматическое.

Если Вы забыли принять Метеоспазмилл:

Не принимайте двойную дозу для восполнения пропущенной.



Если у Вас остаются какие-либо дополнительные вопросы по поводу использования этого лекарственного средства, спросите Вашего врача или фармацевта.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Как и другие лекарственные средства, этот препарат также может вызывать побочные реакции, хотя не у каждого пациента.

Если у Вас проявляются какие-либо нижеперечисленные нежелательные реакции, немедленно обратитесь к врачу:

а. Признаки серьезной аллергической реакции, особенно отек лица, губ, рта, языка и / или горла, которые могут вызывать затруднения дыхания или глотания, сыпь на коже, зуд, сильное головокружение с повышенной частотой сердечных сокращений и обильным потоотделением (тяжелая аллергическая реакция считается очень редким явлением и случается реже чем у 1 из 10 000 человек).

б. Признаки, указывающие на нарушение работы печени. Симптомы могут включать пожелтение кожи или белка глаз, потемнение мочи, потерю аппетита, тошноту или рвоту (воздействие на печень случается очень редко - реже, чем у 1 из 10 000 человек).

Другие нежелательные реакции, перечисленные ниже, встречались с неизвестной частотой (для оценки частоты недостаточно имеющейся информации):

- Сыпь на коже,
- Волдыри,
- Зуд,
- Головокружение,
- Головные боли,
- Тошнота,
- Повышение уровня печеночных ферментов (трансаминазы, щелочные фосфатазы) и билирубина в крови (см. Раздел 2 «Что следует знать перед приемом лекарственного средства Метеоспазмилл»).

При появлении перечисленных нежелательных реакций, а также реакций, не указанных в инструкции, необходимо обратиться к врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Сообщение о нежелательных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это позволяет проводить постоянный мониторинг соотношения польза / риск при применении лекарственного средства. При возникновении нежелательных реакций Вы можете сообщить об этом через национальную систему репортирования (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении МЗ РБ», <https://www.rceth.by/>).



5. СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА МЕТЕОСПАЗМИЛ

Срок годности

3 года.

Не используйте Метеоспазмил после окончания срока годности. Датой истечения срока годности является последний день месяца, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте.

Не выбрасывайте любые лекарственные средства в сточные воды или в бытовые отходы. Попросите Вашего фармацевта утилизировать лекарственные средства, которые Вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Состав

В одной капсуле содержится:

Действующие вещества:

Альверина цитрат - 60 мг

Симетикон - 300 мг;

Вспомогательные вещества: соевый лецитин, триглицериды средней плотности.

Состав оболочки капсул: желатин, глицерин (E422), титана диоксид (E171), вода очищенная.

Как выглядит Метеоспазмил и сколько капсул находится в упаковке

Описание: мягкие продолговатые, светло-желтого цвета блестящие капсулы, размер 6.

По 10 капсул в блистере из ПВХ/алюминия. По 2 или 3 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.

Не все виды упаковок могут находиться в продаже.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

6, avenue de l'Europe 51, 78401 Chatou, Франция.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОТОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ

Laboratoires Galeniques Vernin

20, rue Louis-Charles Vernin, 77190 Dammarie-les-Lys, Франция.