

Альдокорт

Флудрокортизона ацетат

Форма выпуска

Альдокорт, таблетки: каждая таблетка содержит 0,10 мг флудрокортизона ацетата (Фарм. США).

Описание

Флудрокортизона ацетат — синтетический кортикостероид, обладающий очень сильными минералокортикоидными свойствами и высокой глюкокортикоидной активностью.

Показания к применению

Используется в качестве пероральной заместительной терапии минералокортикоидами при:

- первичной и хронической надпочечниковой недостаточности при болезни Аддисона;
- сольтеряющей форме адреногенитального синдрома;
- постуральной гипотензии.

Способ применения и дозы

- Первичная и хроническая надпочечниковая недостаточность при болезни Аддисона: Стандартная доза может составлять от 0,2 мг 3 раза в неделю до 0,2 мг ежедневно. При возникновении гипертензии необходимо уменьшить дозу до 0,05 мг в сутки. Применяют одновременно с кортизоном или гидрокортизоном.
- Сольтеряющая форма адреногенитального синдрома: 0,1–0,2 мг/сутки.
- Постуральная гипотензия: 0,1–0,4 мг в сутки пациентам с сахарным диабетом с постуральной гипотензией; 0,05–0,2 мг в сутки пациентам с постуральной гипотензией, вторичной по отношению к терапии леводопой.

Нежелательные реакции

Большинство нежелательных реакций вызвано минералокортикоидной активностью препарата (задержкой натрия и воды), включая эритему, пурпуру (геморрагическую сыпь), головокружение, панкреатит, повышение внутриглазного давления, мышечную слабость, гипертонию, отеки, увеличение сердца, застойную сердечную недостаточность, стероидную миопатию, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, остеопороз, судороги, нарушения менструального цикла, гипокалиемию, гипокалиемический алкалоз, аллергические и анафилактические реакции и др.

При применении флудрокортизона в рекомендуемых малых дозах нежелательные реакции обычно не вызывают проблем, однако следует помнить о вышеперечисленных нежелательных реакциях, особенно при длительном применении флудрокортизона или в сочетании с кортизоном или аналогичным глюкокортикоидом.

Меры предосторожности

Из-за выраженного влияния на задержку натрия не рекомендуется использовать флудрокортизон для лечения других заболеваний, кроме указанных в листке-вкладыше. Флудрокортизон следует с осторожностью применять у пациентов, страдающих различными инфекциями (такими как туберкулез, корь, ветряная оспа, опоясывающий герпес или заражение острицами), застойной сердечной недостаточностью, гипертензией, почечной недостаточностью, остеопорозом, медикаментозно индуцированным вторичной надпочечниковой недостаточностью, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечным анастомозом и язвенным колитом.

Использование при беременности и кормлении грудью

Беременность: категория С. Адекватные и хорошо контролируемые исследования для беременных женщин отсутствуют. Флудрокортизон рекомендуется применять во время беременности только в том случае, если нет альтернатив и польза превышает риск.

Лактация: данные о выделении флудрокортизона с человеческим молоком отсутствуют. Однако кортикостероиды (системная терапия) попадают в грудное молоко и могут вызвать подавление роста и/или другие нежелательные реакции у грудных детей. Производитель рекомендует соблюдать осторожность при назначении флудрокортизона кормящим женщинам.

Противопоказания

При надпочечниковой недостаточности абсолютных противопоказаний нет. При лечении неэндокринных заболеваний, где чаще используется фармакологическая доза, необходимо учитывать противопоказания. К относительным противопоказаниям относятся: системная грибковая инфекция, повышенная чувствительность к флудрокортизону, сахарный диабет, остеопороз и острые инфекции.

Лекарственное взаимодействие

Возможно взаимодействие со следующими препаратами: амфотерицин В, калийвыводящие диуретики, антихолинэстеразные препараты, антикоагулянты, противодиабетические препараты, противотуберкулезные препараты, циклоспорин, гликозид наперстянки, пероральные контрацептивы и кетоконазол.

Передозировка

Передозировка маловероятна, однако лечение передозировки заключается в обеспечении поддерживающей и симптоматической терапии.

Хранение

Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от света.

Коммерческая упаковка

Альдокорт, таблетки: каждая коробка содержит 3 блистера по 10 таблеток.

Произведено компанией

Incepta Pharmaceuticals Ltd
Savar, Dhaka, Bangladesh (Бангладеш)

ALD

Ред. № 01