

НД РБ

8549 - 2017

ИММУНОКИНД
Таблетки

Листок-вкладыш. Информация для пациентов

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
06.04.2017 № 633

Внимательно прочтайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть, Вам понадобится прочитать его еще раз. Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если сочтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

Состав лекарственного средства

В 1 таблетке (100 мг) содержатся:

активные вещества: Calcium carbonicum Hahnemanni (Кальцикм карбоникум Ганеманна) D6 20 мг, Calcium fluoratum (Кальция фторид) D6 20 мг, Calcium phosphoricum (Кальция фосфат) D6 20 мг, Sulfur iodatum (Серы йодид) D12 20 мг (активные вещества содержат лактозу);

вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, тальк, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется для поддержки иммунной системы у детей грудного и младшего возраста.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте применения.

В случае выраженных симптомов необходимо назначение соответствующей клинически обоснованной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к какому-либо из активных или вспомогательных веществ.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдалось.

Пожалуйста, информируйте Вашего врача или фармацевта, если Ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие лекарственные средства. Это касается также лекарственных средств, которые можно приобрести без рецепта.

Меры предосторожности

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, специализирующимся на гомеопатическом методе лечения.

Пациентам с заболеваниями щитовидной железы перед применением необходима консультация лечащего врача.

Иммунокинд таблетки содержат лактозу. В связи с содержанием лактозы лекарственное средство не следует принимать пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбией глюкозы-галактозы.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае продолжительного приема гомеопатического средства необходимо наблюдение врача, специализирующегося на гомеопатическом методе лечения, поскольку возможно возникновение нежелательных симптомов.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

НД РБ

Применение у детей

Перед применением у детей до 1 года необходима консультация врача.

Применение у детей в возрасте до 3 месяцев не рекомендуется.

8549 - 2017

Беременность и кормление грудью.

Иммунокинд таблетки не предназначены для применения взрослыми.

Данные о влиянии на fertильность отсутствуют.

Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Иммунокинд таблетки не оказывают или оказывают незначительное влияние на способность вождения автомобиля и работу с механизмами.

Способ применения и дозировка

Дети от 3 месяцев до 6 лет: по 1 таблетке до 3 раз в сутки.

Перед применением у детей до 1 года необходима консультация врача.

Дети в возрасте до 3 месяцев: применение у детей в возрасте до 3 месяцев не рекомендуется.

Перед применением таблетки растворять в небольшом количестве кипяченой воды комнатной температуры (около 10 мл), принимать за полчаса до или через полчаса после еды.

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Побочные действия

Возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение данного лекарственного средства и обратиться к врачу.

Примечание. При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Срок годности

5 лет.

Не применяйте ИММУНОКИНД после даты истечения срока годности, указанной на картонной коробке и на флаконе.


Хранение

Хранение данного лекарственного средства не требует особых условий. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка и ее содержимое

Стеклянные флаконы по 150 таблеток, упакованные в картонные коробки.

Белые или почти белые плоскоцилиндрические таблетки с фаской.



НД РБ

Категория отпуска
Отпускается без рецепта.

8549 - 2017

Фирма-производитель, адрес



Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homoopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse 24
tel. +49 (721) 40 93 236

Представитель в Республике Беларусь

Представительство "Alpen Pharma AG" в Республике Беларусь
220053 г. Минск, ул. Пархоменко 3, офис 1Б
тел/факс (+375 17) 3350642.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь