


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ
(информация для пациентов)
по медицинскому применению лекарственного средства
ГЕПАРИН ПЛЮС

Перед применением данного лекарственного средства полностью прочитайте этот листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь к лечащему врачу или провизору (фармацевту), или медицинской сестре.

Это лекарственное средство назначено именно Вам. Не передавайте его другим. Оно может навредить этим людям, даже, если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или провизору (фармацевту), или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе «Побочное действие» листка-вкладыша.

Торговое название: Гепарин Плюс.

Форма выпуска: мазь для наружного применения.

Состав: 1 г мази содержит: действующих веществ – гепарина (в виде гепарина натрия) - 100 МЕ; бензокаина - 40 мг; бензилникотината - 0,8 мг; вспомогательные вещества - глицерин, парафин мягкий белый, стеариновая кислота, кукурузное масло рафинированное, эмульгатор композиционный, метилпарагидроксибензоат Е 218, пропилпарагидроксибензоат Е 216, воду очищенную.

1985Б-2019

Описание: мазь однородной консистенции белого с желтоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа: средства, применяемые при варикозном расширении вен. Гепарины или гепариноиды для наружного применения.

Код АТХ: С05ВА53

Показания к применению

- тромбоз флебит поверхностных вен;
- поверхностный перифлебит;
- подкожная гематома;
- постинъекционный и постинфузионный флебит;
- отек и кровоподтек в результате травм и ушибов мягких тканей (не раньше, чем через сутки после травмы);
- наружный геморрой.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Наличие в настоящий момент или в анамнезе гепарин-индуцированной тромбоцитопении II типа. Гипокоагуляция.


Кровотечение в месте предполагаемого нанесения мази, нарушение целостности кожных покровов пораженной области (открытые инфицированные раны, язвенно-некротические процессы в особенности).

Детский возраст до 18 лет.

Меры предосторожности

Не следует наносить на открытые раны, при наличии гнойных процессов. Применение мази не рекомендуется при глубоком венозном тромбозе.

При применении местных форм гепарина (в том числе мази) не исключен риск развития гепарин-индуцированной иммунной тромбоцитопении II типа со снижением количества тромбоцитов $<100.000 \times 10^9/\text{л}$ или $<50\%$ от исходного уровня с развитием артериального или венозного тромбоза. Для профилактики данного осложнения необходимо контролировать



1985Б-2019

СОГЛАСОВАНО

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

уровень тромбоцитов у пациентов с эпизодами тромбоза в анамнезе. Максимальный риск развития данного осложнения наблюдается на 6-14 день после начала лечения. В связи с возможностью системного действия, использовать лекарственное средство Гепарин Плюс, мазь следует с осторожностью. У пациентов с повышенной чувствительностью к гепарину тромбоцитопения может развиваться в течение нескольких часов.

Пациентам, имеющим в анамнезе тромбоемболические осложнения, следует назначать гепариновую мазь, с осторожностью, в связи с возможностью системного действия мази. С целью дифференциальной диагностики гепарин-индуцированной тромбоцитопении II типа рекомендуется определять количество тромбоцитов в крови.

При отсутствии эффекта от проводимой терапии или ухудшении состояния рекомендуется обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят тонким слоем на область поражения (из расчета 0,5-1 г на участок диаметром 3-5 см) и осторожно втирают в кожу 2-3 раза в день ежедневно до исчезновения воспалительных явлений, в среднем от 3 до 7 дней. Возможность проведения более длительного курса лечения определяется врачом.

При тромбозе наружных геморроидальных узлов применяют ректальные тампоны, мазь наносят на бязевую или полотняную прокладку, которую накладывают непосредственно на тромбированные узлы и фиксируют. Мазь следует применять ежедневно, до исчезновения симптомов, в среднем, от 3 до 10 дней. С этой же целью можно использовать тампон, пропитанный мазью, который вводят в задний проход.


Побочное действие

Гиперемия кожи, аллергические реакции.

Метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат могут вызывать аллергические реакции замедленного типа. Бензилникотинат может вызывать чувство жжения.

Передозировка

1985 Б - 2019



В связи с незначительной системной абсорбцией передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Мазь не назначают одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), тетрациклинами, блокаторами H₁-гистаминовых рецепторов.

При одновременном назначении антикоагулянтов и дезагрегантов (например, варфарина, ацетилсалициловой кислоты, дипиридамола, стрептокиназы) возможно усиление противосвертывающего эффекта гепарина.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Лекарственное средство не оказывает неблагоприятного влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность применения препарата при беременности и в период лактации не установлена. Гепарин не проходит через плацентарный барьер и не выделяется с грудным молоком. Сведений о попадании других компонентов препарата в грудное молоко нет. Лекарственное средство Гепарин Плюс, мазь применяют при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Применение у детей

Не применять у детей.

Упаковка

По 25 г в тубах алюминиевых. Каждая туба вместе с листком вкладышем по медицинскому применению помещается в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Срок годности

2 года. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, г. Борисов Минской обл., ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177)735612, 731156.