

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
СТРЕПТОЦИД

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

- *Сохраняйте инструкцию по применению, она может понадобиться вновь.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*
- *Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.*

Регистрационный номер: ЛП-004556

Торговое наименование: Стрептоцид

Международное непатентованное наименование: сульфаниламид

Лекарственная форма: порошок для наружного применения

Состав: сульфаниламид (стрептоцид) – 2,0 г или 5,0 г

Описание: белый или почти белый кристаллический порошок без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство – сульфаниламид.

Код АТХ: D06BA05

Фармакологические свойства

Стрептоцид – противомикробное бактериостатическое средство. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой (ПАБК) и угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза дигидрофолиевой, а затем тетрагидрофолиевой кислоты и в результате – к нарушению

синтеза нуклеиновых кислот микроорганизмов. Активность проявляется в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Vibrio cholerae*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Yersinia pestis*, *Chlamydia* spp., *Actinomyces israelii*, *Toxoplasma gondii*.

Показания к применению

В составе комплексной терапии: гнойные раны, инфицированные ожоги (I – II степени) и другие гнойно-воспалительные процессы кожи.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к сульфаниламидам;
- заболевания кроветворной системы;
- угнетение костно-мозгового кроветворения;
- анемия;
- хроническая сердечная недостаточность;
- тиреотоксикоз;
- почечная или печеночная недостаточность;
- азотемия;
- порфирия;
- врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- беременность и период грудного вскармливания.

С осторожностью

Детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно, наносят непосредственно на пораженную поверхность (в виде порошка для наружного применения); перевязки проводят через 1-2 дня. Максимальная разовая доза для взрослых-5 г, максимальная суточная доза для взрослых-15 г. Для детей старше 3 лет: разовая доза-300 мг, суточная доза-300 мг.

Если после лечения улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

При повышенной чувствительности к сульфаниламидным средствам возможны местные аллергические реакции, развитие которых требует немедленной отмены препарата.

Кроме того возможны: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диспепсия, цианоз, лейкопения, агранулоцитоз, кристаллурия.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или были замечены любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, кишечная колика, головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, обморочные состояния, спутанность сознания, нарушение зрения, лихорадка, гематурия, кристаллурия; при продолжительной передозировке – тромбоцитопения, лейкопения, мегалобластная анемия, желтуха.

Лечение: обильное питье; при случайном приеме внутрь – промывание желудка.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Миелотоксические лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата.

Если Вы принимаете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Стрептоцид проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Во время терапии рекомендуется обильное щелочное питье. При необходимости одновременно

назначают противомикробные препараты внутрь. При длительном лечении рекомендуется систематический контроль картины крови, функции печени и почек.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Исследования препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводились. Учитывая побочные действия лекарственного средства (головокружение) следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Порошок для наружного применения.

По 2,0 или 5,0 г в термосвариваемые пакеты из материала упаковочного комбинированного.

По 1, 2, 5, 10, 20, 50 или 100 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 100, 200 или 500 пакетов вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку (Для стационаров).

Условия хранения

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии

ООО «Аромасинтез», Россия

248010, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д.39.

Телефон/факс: +7(4842)53-87-97.

Адрес для обращений и претензий

248010, г. Калуга, п/о 10, а/я 810.