



Листок-вкладыш – информация для потребителя
СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО,
жидкость для инъекций
Действующее вещество: стекловидное тело

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО
3. Применение препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО,
и для чего его применяют**

СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО представляет собой препарат животного происхождения, получаемый из стекловидного тела глаз крупного рогатого скота и свиней. Препарат корректирует метаболизм костной и соединительной ткани.

СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО применяется для размягчения и рассасывания рубцовой ткани, для ускорения образования костной мозоли при переломах и уменьшения боли при повреждении периферических нервов.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО**

Не применяйте данный препарат, если:

- у Вас инфекционные заболевания;
- у Вас острые воспалительные процессы;
- у Вас кахексия (истощение организма);
- у Вас нефрит, нефросклероз (заболевания почек);
- у Вас цирроз печени;
- у Вас сердечная недостаточность II и III стадии;
- у Вас онкологические заболевания;
- Вы беременны или кормите ребенка грудью.

Дети и подростки

Применение противопоказано у детей и подростков младше 18 лет.

Если Вы не уверены, относится ли к Вам что-либо из вышеперечисленного, сообщите лечащему врачу перед применением препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы склонны к аллергическим реакциям.

Другие препараты и СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО

Несмотря на то, что при применении данного препарата одновременно с другими лекарственными препаратами негативных явлений не отмечено, сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без предписания.

Беременность, грудное вскармливание и fertильность

Если Вы беременны, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь с врачом перед началом применения препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО.

Опыт применения лекарственного средства у беременных и женщин в период кормления грудью отсутствует, поэтому не следует применять данный препарат в эти периоды.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Не установлено.

3. Применение препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Режим дозирования

Препарат вводят под кожу по 2 мл ежедневно.

Продолжительность лечения

Курс лечения *при невралгиях* – 8-10 дней, *при рубцах, контрактурах и переломах* – до 25 дней.

Повторение курса лечения рекомендуется через один месяц или позднее.

Длительность лечения определяется врачом индивидуально.

Способ применения

Подкожно.

Пациенты с нарушением функции почек, печени, пациенты пожилого возраста

Данные об особенностях дозирования у пациентов с нарушением функции почек, печени, пациентов пожилого возраста отсутствуют.

Применение у детей

Информация об эффективности и безопасности применения лекарственного средства у детей отсутствует.

Если Вы применили препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО больше, чем следовало

Явлений передозировки при применении лекарственного препарата не описано.

Не превышайте рекомендуемую длительность применения препарата.

Если Вы забыли применить препарат СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО


Если Вы забыли выполнить инъекцию, препарат следует ввести при первой возможности. Не следует вводить двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Если Вы пропустили несколько инъекций, сообщите об этом врачу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможны аллергические реакции в виде усиления боли и воспаления в области введения; крапивница, зуд, сыпь, гиперемия кожи (переполнение кровью сосудов кровеносной системы), эритема (интенсивное покраснение кожи), анафилактические реакции.



Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО

Хранить при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав на одну ампулу: стекловидное тело – 2 мл.

Внешний вид препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО и содержимое упаковки

СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО, жидкость для инъекций, – прозрачная слегка желтоватая жидкость. Допускается легкая опалесценция, наличие мелкой кристаллической и тканевой взвеси.

По 2 мл в ампулы. На ампулу наклеивают этикетку самоклеящуюся.

По 10 ампул вместе с листком-вкладышем и скарификатором ампульным помещают в коробку из картона. Коробку обклеивают этикеткой-бандеролью из бумаги писчей.

По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем и скарификатором ампульным помещают в пачку.

При использовании ампул, имеющих кольцо излома, допускается упаковка ампул без скарификатора ампульного.

Условия отпуска: по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: