



## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

### ЦИСТИВИТ

**Торговое название:** Цистивит

**Лекарственная форма:** капсулы

**Состав:** одна капсула содержит: клюквы экстракта сухого стандартизованного (40% проантоцианидинов) в пересчете на проантоцианидины – 36,0 мг, кислоты аскорбиновой – 60,0 мг.

**Вспомогательные вещества:** лецитин (Солек В-10, соевый жидкий), воск пчелиный желтый, подсолнечное масло.

**Состав оболочки капсулы:** желатин, глицерин, титана диоксид Е-171, вода очищенная, натрия бензоат Е-211, красители: железа оксид красный Е-172, железа оксид черный Е-172, кармуазин Е-122.

**Описание.** Капсулы мягкие желатиновые овальной формы, красно-фиолетового цвета, непрозрачные, упругие, со швом.

**Фармакотерапевтическая группа:** Прочие урологические препараты.

Код ATX G04BX.

#### **Показания к применению**

Лекарственное средство Цистивит применяется в качестве вспомогательного средства в комплексной терапии заболеваний нижних отделов мочевыводящих путей. Применение его основано на опыте длительного использования экстракта и сока клюквы при заболеваниях мочевыводящих путей.

#### **Способ применения и дозы**

Цистивит принимают по 1 капсуле на ночь, запивая стаканом воды (после опорожнения мочевого пузыря). Длительность приема составляет от 2 до 4 недель. При необходимости курс повторяют.

При инфекциях мочевыводящих путей с болезненным мочеиспусканием и жжением во время мочеиспускания, а также после завершения курса лечения инфекций мочевыводящих путей антибиотиками следует принимать Цистивит в течение, по крайней мере, 1 месяца.

Увеличение периода применения стабилизирует достигнутый эффект.

#### **Меры предосторожности**

Не превышайте указанную дозу.

Если состояние ухудшается или симптомы сохраняются больше одной недели, следует проконсультироваться с врачом.

Применение у детей и подростков в возрасте до 18 лет не рекомендуется, поскольку данных недостаточно.

Перед приемом препарата пациенту следует проконсультироваться с врачом при наличии следующих симптомов: лихорадка, судороги, боль в животе, боли в спине, гематурия, задержка мочи или недержание мочи.

**Информация о вспомогательных веществах:**

Лекарственное средство содержит в составе капсулы кармуазин Е-122, который может вызывать аллергические реакции.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Индивидуальные сообщения о нежелательных реакциях указывают на возможное взаимодействие между варфарином и клюквенным соком, в большинстве случаев приводящее к увеличению МНО или кровотечению. Другие антагонисты витамина К, такие как аценокумарол и фениндион, иногда используемые вместо варфарина, могут также потенциально взаимодействовать с клюквенным соком. На сегодняшний день нет сообщений о взаимодействии между клюковой и новыми антикоагулянтами прямого действия, которые не являются антагонистами витамина К (такими как апиксабан, эдоксабан, дабигатран и ривароксабан) или парентеральными антикоагулянтами (такими как гепарин, далтепарин, эноксапарин и тинзапарин); однако клиническое исследование демонстрирует потенциальное фармакодинамическое взаимодействие между клюковой и варфарином. Поэтому одновременное использование антикоагулянтных препаратов и продуктов из клюквенного сока противопоказано. Нет никаких доказательств того, что клюквенный сок оказывает клинически значимое влияние на фармакокинетику амоксициллина или цефаклора.

### **Побочное действие**

Со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея (частота неизвестна).

Аллергические реакции: кожный зуд, кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек и др.

### **Передозировка**

О случаях передозировки лекарственного средства не сообщалось.

### **Противопоказания**

- гиперчувствительность к компонентам, входящим в состав препарата;
- отеки, обусловленные сердечной или почечной недостаточностью;
- заболевания почек (в настоящее время или в анамнезе), в том числе почечнокаменная болезнь;
- состояния, при которых рекомендовано ограничение приема жидкости, например, тяжелые заболевания сердца и почек;
- одновременный прием антикоагулянтов.

### **Беременность и период грудного вскармливания**

Применение препарата Цистивит во время беременности и в период кормления грудью не рекомендуется в связи с отсутствием достоверных данных о влиянии препарата на организм беременной женщины и на ребенка.

**Влияние на возможность вождения автомобиля, работу с техникой**  
Не влияет.

### **Упаковка**

Капсулы мягкие желатиновые овальной формы, красно-фиолетового цвета, непрозрачные, упругие, со швом; по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 3 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачке.

### **Условия хранения**

Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C.

Хранят в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Отпуск производится без рецепта врача.

**Информация о производителе:**

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,  
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, д. 26  
тел./факс (+ 37517) 276-01-59  
e-mail: [info@mic.by](mailto:info@mic.by), [www.mic.by](http://www.mic.by)