


25.09.2017
Д



Листок-вкладыш
(информация для пациента)

Березы листья
Betulae folium

Регистрационный номер _____

Общая характеристика. Кусочки тонких, ломких листьев различной формы, темно-зеленого цвета с верхней стороны и зеленовато-серого цвета с нижней стороны, голых или опущенных с характерным сетчатым жилкованием, проходящим сквозь сито (5600). Запах слабый.

Березы листья содержат не менее 1,5% флавоноидов (в пересчете на гиперозид), эфирное масло, основными компонентами которого являются сесквитерпеноиды а-бетулинов и его ацетат, тритерпеноиды даммаранового ряда, аскорбиновую кислоту, каротиноиды, фенолкарбоновые кислоты, горечи, фитонциды, дубильные вещества, соли магния, калия, цинка, меди и другие соединения.

Состав. Березы листья, измельченное сырье.

Форма выпуска. Измельченное сырье 50 г и 100 г в пачке.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства, применяемые для лечения урологических заболеваний.

Фармакологические свойства. Настой листьев березы обладает диуретическим действием.

Показания к применению.

Внутрь: в составе комплексной терапии в качестве диуретического средства при заболеваниях мочевыводящих путей легкой степени тяжести.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 2-3 г (1 столовая ложка) измельченных листьев помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые и дети старше 12 лет принимают внутрь в теплом виде по 1 стакану настоя 3-4 раза в день за 10-15 мин до еды.

Продолжительность приема определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие. Возможно развитие нарушений желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея) и аллергических реакций (зуд, сыпь, крапивница). При длительном применении может вызвать раздражение почечной паренхимы и обострение воспалительных заболеваний почек.

В случае развития побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием настоя и обратиться к врачу.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к лекарственному средству, включая гиперчувствительность к пыльце березы или другим растительным компонентам. Гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность. Заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, тяжелые заболевания сердца или почек). Беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Информация отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Передозировка. Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. Чтобы обеспечить увеличение количества мочи в процессе лечения необходим адекватный прием жидкости.

Настой листьев березы следует принимать с осторожностью, необходим контроль анализов мочи.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, появляются нарушения мочеиспускания, боль, кровь в моче), необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей

Применение у детей в возрасте до 12 лет не рекомендуется из-за отсутствия достаточных данных.

Применение во время беременности и кормления грудью

В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

Влияние на способность управлять автотранспортом и работу с движущимися механизмами. Информация отсутствует.

Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой – при температуре от 8 °C до 15 °C не более 2 суток.

Срок годности – 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка. По 50 г или 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. Предусмотрено вложение листка-вкладыша в пачку.

Производитель. ООО «Калина».

Адрес. Республика Беларусь
211019 Витебская обл.,
Оршанский район, д. Пищалово
Тел. (0216) 54-81-68