



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)
БЕРЕЗЫ ПОЧКИ
(*BETULAE GEMMA*)

Прочтите внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение лекарственного средства.

Сохраняйте этот листок – вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его еще раз.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Торговое название. Березы почки.

Международное непатентованное название (МНН). Отсутствует.

Форма выпуска. Цельное лекарственное растительное сырье.

Состав. Березы почки, 100 г.

Описание. Почки удлиненно-конические, заостренные или притупленные, часто клейкие. Чешуйки расположены черепицеобразно, плотно прижаты по краям, слегка реснитчатые (нижние короче верхних и иногда с несколько отстающими кончиками); длина 3-7 мм, ширина от 1,5 мм до 3 мм. Цвет коричневый, у основания иногда зеленоватый. Запах бальзамический.

Березы почки содержат эфирное масло, аскорбиновую кислоту, дубильные вещества, флавоноиды, жирные кислоты (линовую, линоленовую и др.), смолистые вещества и другие биологически активные вещества.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства, применяемые для лечения урологических заболеваний.

Фармакологические свойства. Настой почек березы обладает диуретическим действием. Настой почек березы является растительным средством, применение которого основано исключительно на опыте традиционного использования.

Показания к применению. В составе комплексной терапии в качестве диуретического средства при заболеваниях мочевыводящих путей легкой

степени тяжести.

Способ применения и дозировка. 10 г (1/2 столовой ложки) почек помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут. Охлаждают не менее 45 минут при комнатной температуре, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые и дети старше 12 лет принимают внутрь в теплом виде по 1/3 стакана 2-3 раза в день за 10-15 минут до еды.

Продолжительность приема настоя определяется индивидуально с учетом течения заболевания, достигнутого эффекта и состояния пациента.

Перед употреблением настоя рекомендуется взбрызнуть настой из бутылки.

СОГЛАСОВАНО
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Побочное действие. Возможно развитие нарушений желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея) и аллергических реакций (зуд, сыпь, крапивница, аллергический ринит). При длительном применении может вызвать раздражение почечной паренхимы и обострение воспалительных заболеваний почек.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к лекарственному средству, включая гиперчувствительность к пыльце бересклета или другим растительным компонентам. Гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность. Заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, тяжелые заболевания сердца и почек).

Беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Передозировка. Информация о случаях передозировки отсутствует.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. Чтобы обеспечить увеличение количества мочи в процессе лечения необходим адекватный прием жидкости.

Настой почек бересклета следует принимать с осторожностью, под контролем анализа мочи.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, появляются нарушения мочеиспускания, боль, кровь в моче), необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось. Перед совместным

приемом с другими лекарственными средствами необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение у детей. Применение у детей в возрасте до 12 лет не рекомендуется из-за отсутствия достаточных данных.

Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных **применять во время беременности и лактации не рекомендуется.**

Влияние на способность к управлению автотранспортом и работе с механизмами. Исследования по оценке влияния на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Условия хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Приготовленный настой – в прохладном месте (при температуре от 8 °С до 15 °С) не более 2 суток.

Условия отпуска из аптек. Без рецепта.

Срок годности. 2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Упаковка. В пакеты бумажные по 100 г. По одному пакету бумажному вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Производитель. ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь, Минский район, деревня Цнянка, военный городок 137 «А», административное здание ЗАО «БелАсептика», комната 7. Тел. (017) 500 33 11, тел./факс (017) 500 33 46.