

НД РБ
2874 - 2018
ЦИННАБСИН
Таблетки
Листок-вкладыш
Информация для пациентов



Внимательно прочитайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть, Вам понадобится прочитать его еще раз. Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если счтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

Общие физико-химические свойства

Таблетки белого или почти белого цвета, плоские, со скошенной кромкой, возможно наличие вкраплений более темного цвета.

Состав лекарственного средства

1 таблетка содержит:

активные вещества: Cinnabaris trit. D3 25 мг , Hydrastis trit. D3 25 мг, Kalium bichromicum trit. D3 25 мг, Echinacea trit. D1 25 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Форма выпуска

Таблетки.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство

Область применения

Гомеопатическое лекарственное средство без утверждённых терапевтических (медицинских) показаний к применению. Применяется в комплексной терапии острого и хронического воспаления придаточных пазух носа (синусит).

Противопоказания

Циннабсин противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к одному из активных веществ, к другим растениям семейства сложноцветных (Asteraceae/Compositae), другим компонентам, входящим в состав препарата.

Циннабсин противопоказан детям младше 6 лет.

Взаимодействие с лекарственными средствами

Информация о взаимодействиях отсутствует.

В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Меры предосторожности.

Гомеопатическое лекарственное средство. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

В случае развития отека лица, повышения температуры, сильной головной боли, появлении новых симптомов, а также, если в течение первых 2 дней лечения Ваше состояние не улучшается или же ухудшается необходимо обратиться к врачу.

Использование препарата Циннабсин не рекомендуется при:

- прогрессирующих системных заболеваниях (таких как туберкулез, саркоидоз)

2874 - 2018

- системных заболеваниях системы лейкоцитов (например, лейкемия или лейкозы)
- аутоиммунных заболеваниях (например, системные заболевания соединительной ткани (коллагенозы), рассеянный склероз)
- иммунодефиците (СПИД, ВИЧ-инфекция)
- иммуносупрессии (например, после трансплантации органов или костной ткани)

После приема препаратов эхинацеи получены сообщения о развитии аллергических реакций (кожные высыпания, зуд, в редких случаях - отек лица, одышка, головокружение, снижение артериального давления). Эхинацея может вызывать аллергические реакции у пациентов с атопическими заболеваниями (например, атопический дерматит, бронхиальная астма, сенная лихорадка). Поэтому пациентам с атопическими заболеваниями перед приемом препарата Циннабсин необходимо проконсультироваться с врачом.

Прием лекарственных препаратов, содержащих эхинацею, в редких случаях ассоциировался с возникновением аутоиммунных заболеваний. Сообщалось о единичных случаях, когда длительное применение препарата (более 8 недель), приводило к снижению количества лейкоцитов.

Циннабсин не следует назначать пациентам с непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью или глюкозо-галактозной мальабсорбией.

В пшеничном крахмале могут присутствовать следы глютена, поэтому следует проявлять осторожность при лечении больных с глютеновой энтеропатией.

Действие гомеопатического средства может уменьшиться при курении или под влиянием других вредных привычек (например, употребление алкоголя).

Беременность и кормление грудью

В связи с отсутствием достаточных данных, прием лекарственного средства Циннабсин во время беременности или кормящими женщинами возможен только после консультации врача в случае, если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка, находящегося на грудном вскармливании.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и работы со специальным оборудованием

Не влияет

Способ применения и дозировка

Если врачом не назначено иначе, Циннабсин принимают следующим образом:

взрослые и дети старше 12 лет при остром течении заболевания принимают по 1 таблетке каждый час (но не более 6 таблеток в сутки) в течение первых двух дней. Для последующего лечения или при хроническом течении заболевания взрослые и дети старше 12 лет принимают по 1 таблетке 1-3 раза в день. Когда выраженность симптомов уменьшится, частота приема должна быть уменьшена. Таблетки следует принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды.

Детям от 6 до 12 лет назначают половину дозы для взрослых. Для этой цели одна таблетка перед применением растворяется в 6 чайных ложках воды. Разовая доза соответствует 3 чайным ложкам приготовленного раствора, принимается за полчаса до или после еды.

Оставшаяся часть раствора дальнейшему применению не подлежит и должна быть уничтожена. При остром течении заболевания раствор (3 чайные ложки) принимается каждый час (но не более 6 раз в сутки) в течение первых двух дней. Для последующего лечения или при хроническом течении заболевания раствор (3 чайные ложки) принимается 1-3 раза в день.

Когда выраженность симптомов уменьшится, частота приема должна быть уменьшена.

Циннабсин не следует принимать без консультации с врачом более 4 недель.

Продолжительность применения лекарственного средства определяется врачом.

НД РБ

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2874 - 2018
Республика Беларусь

Побочные действия

После приема препарата Циннабсин возможны реакции гиперчувствительности, а также тошнота и рвота.

После приема препаратов эхинацеи получены сообщения о развитии аллергических реакций (кожные высыпания, зуд, отек лица, одышка, головокружение, снижение артериального давления, бронхоспастические реакции, анафилактический шок, синдром Стивенса-Джонсона). Эхинацея может вызывать аллергические реакции у пациентов с атопическими заболеваниями (например, атопический дерматит, бронхиальная астма, сенная лихорадка). Пшеничный крахмал может вызывать реакции гиперчувствительности.

В связи с содержанием соединения ртути (*Cinnabar*) возможно усиление слюноотделения и развитие аллергических реакций. В этих случаях следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка.

Информация о случаях передозировки отсутствует.

Срок годности

5 лет.

Дата истечения срока годности указана на упаковке и на этикетке. Не применяйте препарат после этой даты.

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 15 °C до 25 °C в недоступном для детей месте.

Упаковка и содержимое

По 5 блистеров по 20 таблеток пакуют в картонную коробку с листком-вкладышем для пациентов.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Предприятие- производитель

Дойче Хомеопати Унион ДХУ-
Арцнаймиттель ГмбХ &
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24

Тел.: + 49(721)40 93 236

Произведено:

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко КГ,
Германия

Deutsche Homoeopathie-Union Ko KG DHU-
Arzneimittel GmbH & Co. KG Germany, Karlsruhe
76227 Ottostrasse 24 tel. + 49 (721) 40 93 236

Представитель в республике Беларусь

Representative office of "Alpen Pharma AG"

220053 Minsk, Parhomenko.street 3, office IB Tel./Fax (+375 17)3350642.

Представительство компании "Alpen Pharma AG" в Республике Беларусь 22053 г, Минск, ул.
Пархоменко 3, офис 1Б

Тел./факс (+375 17) 3350642.