



Инструкция по медицинскому применению листок-вкладыш

Энтеросепт

100 мг, таблетки, покрытые оболочкой
Действующее вещество: нифуроксазид

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 2 дня вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Энтеросепт и для чего его принимают.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Энтеросепт.
3. Прием препарата Энтеросепт.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Энтеросепт.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ЭНТЕРОСЕПТ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Энтеросепт содержит нифуроксазид.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие кишечные противомикробные препараты.

Нифуроксазид оказывает местное антибактериальное действие в кишечнике в отношении некоторых видов бактерий. Нифуроксазид не уничтожает бактерии, которые в норме присутствуют в кишечнике и не являются болезнетворными.

Препарат Энтеросепт применяется у взрослых и детей старше 7 лет для лечения острой диареи, вызванной кишечной инфекцией, без ухудшения общего состояния, повышения температуры тела, интоксикаций.

При лечении диареи требуется соблюдать соответствующую диету и, при необходимости, восполнять объем потерянной жидкости.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение через 2 дня, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ЭНТЕРОСЕПТ

Не принимайте препарат Энтеросепт если у вас:

- аллергия на нифуроксазид, производные 5-нитрофурана или любые другие компоненты

препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
– детский возраст до 7 лет (в связи с возможными трудностями при проглатывании таблеток).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Энтеросепт проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

В качестве меры предосторожности не следует использовать препарат Энтеросепт во время беременности и в период кормления грудью.

В случае продолжающейся диареи после 2 дней лечения обратитесь к врачу. Врач проведет обследование, чтобы определить причины симптомов и установит дальнейшее лечение.

При возникновении аллергической реакции с такими симптомами как одышка, отек лица, губ, языка, сыпь, зуд следует прекратить применение препарата Энтеросепт и обратиться к врачу.

Во время лечения нифуроксазидом противопоказано принимать алкогольные напитки, так как препарат повышает чувствительность организма к алкоголю и может спровоцировать развитие следующей реакции: обострение диареи, рвота, боль в животе, покраснение кожи, ощущение жара в лице и верхней части туловища, шум в голове, затрудненное дыхание, увеличение частоты сердечных сокращений, ощущение страха (дисульфирамоподобная реакция).

При лечении острой диареи необходимо восполнять потерю жидкости (среднее потребление воды для взрослого – около 2 литров жидкости в сутки). В случае если у вас тяжелая и продолжительная диарея, тяжелая рвота или вы отказываетесь от пищи, следует обратиться к врачу для рассмотрения возможности внутривенного восполнения жидкости.

Дети и подростки

Препарат Энтеросепт не следует применять у детей в возрасте до 7 лет в связи с особенностями лекарственной формы.

Другие препараты и препарат Энтеросепт

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, в том числе, препараты, отпускаемые без рецепта.

Не следует принимать нифуроксазид с препаратами, которые содержат алкоголь (этанол), так как это может привести к развитию дисульфирамоподобной реакции.

Препарат Энтеросепт снижает всасывание многих лекарственных средств из желудочно-кишечного тракта и тем самым нарушает их действие.

Препарат Энтеросепт с пищей, напитками и алкоголем

Необходимо обеспечить адекватное потребление пищи во время лечения диареи, исключая соки, сырье овощи и фрукты, острую и трудноперевариваемую пищу, а также замороженную пищу и холодные напитки. Рекомендуется употребление жареного мяса и риса. Отказ от молока и молочных продуктов следует рассматривать в каждом конкретном случае. Во время лечения нифуроксазидом противопоказано употребление алкогольных напитков, так как препарат повышает чувствительность организма к алкоголю и может спровоцировать дисульфирамоподобную реакцию.


Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Энтеросепт проконсультируйтесь с лечащим врачом.

В качестве меры предосторожности не следует принимать препарат Энтеросепт во время беременности и в период кормления грудью. Не следует принимать препарат Энтеросепт у женщин детородного возраста, не использующих эффективные методы контрацепции.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Энтеросепт не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.



3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА ЭНТЕРОСЕПТ

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослым назначают 8 таблеток в день в 2-4 приема.

Детям старше 7 лет: от 6 до 8 таблеток в день в 2-4 приема.

Дети и подростки

Препарат Энтеросепт не следует принимать детям в возрасте до 7 лет из-за возможных трудностей при проглатывании таблетки.

Путь и способ введения

Препарат принимают внутрь независимо от приема пищи.

Таблетку следует проглотить целиком, запивая достаточным количеством воды, не разжевывая и не измельчая.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения не должна превышать 7 дней.

Если в течение первых 2 дней приема симптомы не исчезнут, то необходимо немедленно обратиться к врачу.

Если вы приняли препарата Энтеросепт больше, чем следовало

Если вы приняли препарата Энтеросепт больше, чем следовало, как можно скорее обратитесь к врачу.

В случае передозировки рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.

Если вы забыли принять препарат Энтеросепт

Если вы забыли принять препарат Энтеросепт, примите следующую дозу в обычное время.

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Энтеросепт может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме препарата могут возникать следующие нежелательные реакции:

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- сыпь на коже, гнойнички на коже, зуд и уплотнения на коже.

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- кожная сыпь, зудящая красная сыпь, сопровождающаяся воспалением кожи (крапивница), внезапный отек части тела, чаще всего губ, языка или горлани (ангионевротический отек), затруднение дыхания, снижение кровяного давления, головокружение, обморок (анафилактический шок);

- боль в животе, тошнота, усиление диареи;

- снижение определенного типа лейкоцитов, называемых гранулоцитами, что может вызвать серьезные инфекции (гранулоцитопения).

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных.

Контактные данные для сообщений о нежелательных реакциях: «РУП «Центр экспертизы и испытаний в здравоохранении» <http://www.rceth.by>, адрес электронной почты: rcpl@rceth.by».

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.



5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЭНТЕРОСЕПТ

Храните препарат в недоступном и незаметном для детей месте.

Дата истечения срока годности

Срок годности препарата 3 года.

Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Условия хранения

Храните препарат при температуре не выше 25 °C, в защищенном от света и влаги месте.

Проконсультируйтесь с работником аптеки о том, как утилизировать ненужный лекарственный препарат. Эти меры способствуют защите окружающей среды.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Энтеросепт содержит

Действующим веществом препарата является нифуроксазид.

1 таблетка Энтеросепт содержит 100 мг нифуроксазида.

Вспомогательными веществами являются: натрия крахмалгликолят (тип А), повидон К30, кальция стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, оболочка (поливиниловый спирт, тальк, макрогол 3350, полисорбат 80).

Внешний вид препарата Энтеросепт и содержимое упаковки

Круглые, двояковыпуклые, желтого цвета таблетки, покрытые оболочкой.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой.

Одну, две, три или пять контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «Рубикон», Республика Беларусь,

210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,

тел/факс: +375 (212) 36-37-06, тел.: +375 (212) 36-47-77,

e-mail: secretar@rubikon.by

За любой информацией о препарате следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения

Республика Беларусь

ООО «Рубикон»,

210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,

тел.: +375 (212) 36-47-77

Данный листок-вкладыш пересмотрен

03/2023

