



**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
**(информация для пациента)**  
**лекарственного средства**  
**Эхинацеи пурпурной трава**  
*(ECHINACEAE PURPUREAE HERBA)*

*Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение лекарственного средства.*

*Сохраняйте этот листок – вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его еще раз.*

*Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

**Торговое название.** Эхинацеи пурпурной трава.

**Международное непатентованное название (МНН).** Отсутствует.

**Форма выпуска.** Измельченное сырье.

**Состав.** Эхинацеи пурпурной трава, 100 г.

**Описание.** Кусочки стеблей, листьев и соцветий, проходящие сквозь сито с номинальным размером отверстия 5600 мкм. Цвет стеблей зеленый, желтовато-зеленый, иногда с розовато-красными или фиолетово-красными пятнами; листьев – от серовато-зеленого до зеленого. Запах слабый.

Эхинацеи пурпурной трава содержит полисахариды, эфирные масла, флавоноиды, оксикоричные кислоты, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства, применяемые при простудных заболеваниях.

**Фармакологические свойства.** В доклинических экспериментальных исследованиях обнаружено влияние эхинацеи пурпурной на неспецифическую иммунную систему.

**Показания к применению.** Внутрь: кратковременная профилактика и лечение в составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний.



Наружно применяется для лечения небольших поверхностных раневых повреждений.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозировка.** 1 столовую ложку травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 минут. Охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые и дети старше 12 лет принимают в теплом виде по ½ стакана 3 раза в день. Для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний препарат не следует использовать более 10 дней. При лечении острых респираторных заболеваний прием препарата следует начинать при первых признаках заболевания.

При лечении раневых повреждений применяют наружно в виде примочек 2-3 раза в день не более 7 дней.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

**Побочное действие.** У пациентов с повышенной чувствительностью могут развиваться аллергические реакции (сыпь, крапивница, экзема, контактный дерматит, отек Квинке, синдром Стивенса-Джонсона, приступ бронхоспазма, анафилактический шок).

Эхинацея может вызвать развитие аллергических реакций у пациентов с атопией.

Были сообщения о связи приема эхинацеи с развитием аутоиммунных заболеваний (рассеянный энцефалит, узловая эритема, тромбоцитопения иммунного характера, синдром Эванса, синдром Шегрена с дисфункцией почечных канальцев).

При приеме более 8 недель может развиваться лейкопения. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим растениям семейства астровых (сложноцветных). Прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания, в т. ч. туберкулез, саркоидоз, коллагенозы, рассеянный склероз, ВИЧ-инфекция или СПИД, распространенный атеросклероз, злокачественные заболевания, патология системы лейкоцитов (гемобластозы, агранулоцитоз и др.), состояние иммунодефицита или иммуносупрессии, прием иммунодепрессантов (циклоспорина, метотрексата и др.), склонность к аллергическим реакциям.

Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, детям до 12 лет.

СОГЛАСОВАНО

ОТСУТСТВУЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

**Передозировка.** Информация о случаях передозировки отсутствует.

**Меры предосторожности.** При лечении острых респираторных заболеваний прием препарата следует начинать при первых признаках заболевания. Пациентам с атопией в связи с риском развития анафилактических реакций перед приемом лекарственного средства необходимо проконсультироваться с врачом.

Если во время приема лекарственного средства происходит ухудшение состояния или поднимается температура, необходимо обратиться к врачу.

В случае появления признаков инфекции при лечении раневых повреждений необходимо обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Исследования по изучению взаимодействия эхинацеи пурпурной с другими лекарственными средствами не проводились. Не рекомендуется применять препараты эхинацеи в период приема иммуносупрессивных средств (например, циклоспорин, метотрексат).

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Применение у детей.** В связи с отсутствием достаточных данных назначение лекарственного средства детям в возрасте до 12 лет не рекомендовано.

**Применение во время беременности и лактации.** В связи с отсутствием достаточных данных применение эхинацеи во время беременности и кормления грудью не рекомендовано.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Исследования не проводились.

**Условия хранения.** В защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Приготовленный настой – в прохладном месте (при температуре от 8 °С до 15 °С) не более 2 суток.

**Условия отпуска из аптек.** Без рецепта врача.

**Срок годности.** 3 года.

*Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!*

**Упаковка.** В пакеты бумажные по 100 г. По 1 пакету бумажному вместе с листком-вкладышем помещают в пачки из картона.

**Производитель.** ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь, 223043, Минская область, Минский район, Папернянский с/с, д. Цнянка, ул. Армейская, д. 8, ком. 7. Тел. (017) 500 33 01, тел./факс (017) 500 33 46.