

Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)

МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ
МЕНТАНЕ ПІРЕРІТАЕ ЛІСЦЬЯ

Регистрационный номер : _____

Форма выпуска

Измельченное сырье.

Общая характеристика

Кусочки листьев различной формы, размером до 10 мм и более с примесью цветков и бутонов. Край листа пильчатый с неравными острыми зубцами; поверхность голая, лишь снизу по жилкам под лупой (10 х) заметны редкие прижатые волоски и по всей пластинке листа – блестящие золотисто-желтые или более темные эфирномасличные железки. Цвет листьев от светло-зеленого до коричневатого-зеленого с возможным присутствием буровато-коричневых и белых (стебель) вкраплений. Запах сильный, ароматный.

Листья мяты перечной содержат флавоноиды, эфирное масло, каротиноиды и другие биологически активные вещества.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства для устранения тошноты.

Фармакологические свойства

Водные извлечения листьев мяты перечной оказывают спазмолитическое и желчегонное действие, снижают тонус нижнего пищеводного сфинктера.

Показания к применению

Внутрь: симптоматическое лечение функциональных расстройств пищеварительного тракта (диспепсия, тошнота, метеоризм).

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к веществам, содержащимся в лекарственном средстве, а также к ментолу. Выраженная артериальная гипотензия, холелитиаз; беременность, период лактации, детский возраст до 4 лет.


Способ применения и дозы

5 г (1,5 столовые ложки) листьев помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) водой комнатной температуры, закрывают крышкой и настаивают в водяной бане при частом помешивании в течение 15 мин, охлаждают при комнатной температуре не менее 45 мин, процеживают, отжимают оставшееся сырье. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде: взрослые – по 1/3-1/2 стакана настоя 3 раза в сутки за 15-20 минут до еды. Дети от 4 до 12 лет - по 2-3 столовые ложки настоя 3 раза в сутки за 15-20 минут до еды. Дети от 12 до 18 лет - по 1/3 стакана настоя 3 раза в день за 15-20 минут до еды.

Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

Продолжительность лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.



Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Вследствие гастроэзофагеального рефлюкса может усиливаться изжога. У пациентов с холелитиазом лекарственное средство может вызвать желчную колику. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Пациентам с заболеваниями печени, желчнокаменной болезнью и другими заболеваниями желчевыводящих путей перед приемом лекарственного средства необходимо обратиться к врачу. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния необходимо обратиться к врачу.

Пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом не рекомендуется прием лекарственного средства из-за возможного усиления изжоги.

Применение в период беременности и лактации

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами

Исследования не проводились. В связи с возможным седативным эффектом во время лечения не рекомендовано управлять автомобилем и работать с механизмами.

Применение у детей

Прием препаратов мяты перечной детям до 4 лет не рекомендован в связи с отсутствием достаточных данных.

Передозировка

При передозировке возможно развитие бронхоспазма, нарушения дыхания, появление боли в области сердца. В случае возникновения симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Информация отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Срок годности - 2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °С.

Приготовленный настой – в прохладном месте не более 2 суток при температуре (8-15) °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

По 50 г в пакете бумажном в пачке картонной. Листок-вкладыш (информация для пациента), вкладывается в пачку.

Производитель: ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, www.padiss.by.

