


НД РБ

5798 - 2016

ИНСТРУКЦИЯ

(информация для пациентов)

по медицинскому применению лекарственного средства
ЛИНКАС



Торговое название: ЛИНКАС

Форма выпуска: сироп без сахара.

Описание: сироп коричневого цвета с характерным запахом. Допустимо образование осадка в процессе хранения.

Состав: 10 мл сиропа содержат:

Активные вещества: густые водные экстракты: адхатоды сосудистой листьев (5:1) – 120,0 мг, перца длинного плодов (4:1) – 25,0 мг, кордии широколистной плодов (4:1) – 25,0 мг, алтея лекарственного семян (4:1) – 25,0 мг, зизифуса обыкновенного плодов (4:1) – 25,0 мг, оносмы прицветниковой листьев (4:1) – 25,0 мг, солодки голой корней и корневищ (4,17:1) – 18,0 мг, иссопа лекарственного цветков (4,17:1) – 12,0 мг, калгана большого корней (4,17:1) – 12,0 мг, фиалки душистой надземных частей (4,17:1) – 6,0 мг.

Вспомогательные вещества: сорбитола раствор 70 % (E420), пропиленгликоль (E1520), глицерин (E422), лимонная кислота безводная (E330), сахарин натрия (E954), метилпарабен (E218), пропилпарабен (E216), масло мяты перечной, масло гвоздичное, вода деионизированная.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства, применяемые при простудных заболеваниях.

Код АТХ: R05X.

Фармакологические свойства

Линкас, сироп без сахара является аюрведическим средством. Оказывает отхаркивающее, муколитическое и противовоспалительное действие.

Показания к применению

В составе комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (фарингит, трахеит, бронхит).

Способ применения и дозировка

Для приема внутрь.

Взрослые: по 10 мл (следует использовать прилагаемый мерный стаканчик) 3-4 раза в день.

Применение лекарственного средства у детей до 18 лет противопоказано.

Длительность применения препарата – 5-7 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Перед употреблением взбалтывать.

Пациенты с нарушением функции почек и/или печени

Лекарственное средство противопоказано пациентам с тяжелым нарушением функции почек и/или печени (см. раздел «Противопоказания».)

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

При возникновении побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата, заболевания печени и/или почек, артериальная гипертензия, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипокалиемия, детский возраст до 18 лет, беременность и период лактации.

Передозировка

При передозировке могут наблюдаться симптомы, характерные для отдельных компонентов препарата. Симптомами передозировки корня солодки являются задержка жидкости в организме, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая энцефалопатия.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности

В связи с содержанием сорбитола прием сиропа не рекомендован пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы. В связи с содержанием сорбитола сироп может оказывать слабительное действие.

В состав препарата входят вспомогательные компоненты метилпарабен (E218) и пропилпарабен (E216), которые могут вызывать аллергические реакции (возможно замедленные).

Препараты солодки не рекомендуется принимать пациентам с артериальной гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипокалиемией, заболеваниями почек и печени, так как данные пациенты более предрасположены к неблагоприятным последствиям приема солодки.

Пациентам, принимающим корень солодки, не следует принимать другие средства, содержащие солодку, из-за риска развития серьезных побочных реакций, таких как задержка жидкости в организме, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма.

Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (развивается нарушение дыхания, повышается температура, появляется кашель с гнойной мокротой), необходимо обратиться к врачу.

Применение у детей

В связи с отсутствием достаточных данных лекарственное средство противопоказано для приема детям и подросткам до 18 лет.

Применение при беременности и кормления грудью

Применение лекарственного средства во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано в связи с отсутствием данных о безопасности.

Влияние на способность управлять транспортом и потенциально опасными механизмами

Исследования по оценке влияния применения лекарственного средства на способность к вождению автотранспорта и работу с движущимися механизмами не проводились.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

Экстракт корней солодки может вызвать снижение эффективности антигипертензивных лекарственных средств. Не рекомендуется одновременное применение с диуретиками, сердечными гликозидами, кортикостероидами, стимулирующими слабительными или другими лекарственными средствами, влияющими на электролитный баланс.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

90 мл препарата в стеклянном флаконе янтарного цвета с колпачком, оснащенным защитным кольцом; 1 флакон с инструкцией по применению и мерным стаканчиком в картонной упаковке.

По 120 и по 150 мл препарата в стеклянном флаконе янтарного цвета с колпачком с защитным от детей замком; 1 флакон с инструкцией по применению и мерным стаканчиком в картонной упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Herbion Pakistan Private Limited

Пакистан, Карачи, 74900, промышленная зона Коранги, участок 30.

Представительство компании «HerbionPakistanPrivateLimited» в Республике Беларусь: 220030, г. Минск, пр. Независимости, д. 25, к. 131, тел. +375 17 2008401.

Website: www.herbion.com

С 1990 г.

Минск

