



**Листок-вкладыш – информация для потребителя
АКТОВИР, мазь для наружного и местного применения
Действующие вещества: ацикловир + бутаминофен**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболеваний совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 данного листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат АКТОВИР и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата АКТОВИР.
3. Применение препарата АКТОВИР.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата АКТОВИР.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что собой представляет препарат АКТОВИР,
и для чего его применяют**

Актовир – комбинированное противовирусное лекарственное средство для наружного применения. Актовир предназначен для лечения инфекций кожи, вызванных вирусом *Herpes Simplex*, включая первичный и рецидивирующий генитальный герпес.

У пациентов с ослабленным иммунитетом из-за других заболеваний, таких как ВИЧ/СПИД, или после трансплантации костного мозга, АКТОВИР применять не рекомендуется, следует проконсультироваться с врачом относительно лечения любой инфекции.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата АКТОВИР

Не применяйте АКТОВИР, если:

- у Вас аллергия на ацикловир, бутаминофен или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- у Вас офтальмогерпес (герпес на глазу).

В связи с отсутствием адекватных данных применение лекарственного препарата у детей не рекомендовано.

Если что-либо из выше перечисленного относится к Вам, сообщите лечащему врачу.

Особые указания и меры предосторожности

С осторожностью: беременность и период лактации.

Мазь АКТОВИР используется только для наружного применения. Следует избегать попадания мази на слизистые оболочки полости рта и глаз.

Для предупреждения самозаражения других участков кожи или слизистой оболочки

необходимо использовать напальчники или резиновые перчатки.

Препарат АКТОВИР эффективен для профилактики рецидивов герпеса губ. Эффективность будет тем выше, чем раньше начато лечение (при первых признаках инфекции).

Если у Вас герпес на губах (особенно при наличии открытых поражений), необходимо строго соблюдать правила предосторожности, чтобы не допустить инфицирование других людей (например, мыть руки до и после нанесения препарата, не тереть и не прикасаться к пораженным участкам кожи полотенцем).

Мазь АКТОВИР не предупреждает передачу герпеса половым путем, поэтому в период лечения необходимо воздерживаться от половых контактов, даже при отсутствии клинических проявлений инфекций.

Если Вы не уверены, относится ли к Вам что-либо из выше перечисленного, сообщите лечащему врачу перед применением мази АКТОВИР.

Другие препараты и АКТОВИР

Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без назначения.

При наружном применении взаимодействий с другими лекарственными средствами не выявлено.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Безопасность применения лекарственного препарата при беременности и кормлении грудью не установлена.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияние на способность управлением автотранспортом или работу с другими механизмами маловероятно.

3. Применение препарата АКТОВИР

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Способ применения

Наружно. Только для местного применения.

Режим дозирования

Препарат рекомендуется наносить на пораженные и граничащие с ними участки кожи 5-6 раз в сутки, небольшой полоски мази длиной около 1 см достаточно для обработки 25 см² пораженной области (площадь примерно 5 см×5 см).

Препарат необходимо применять как можно раньше, желательно уже при первых признаках заболевания (в продромальном периоде или при покраснении кожи).

Длительность лечения – не менее 5 дней и не более 10 дней. В случае сохранения симптомов заболевания более 10 дней необходимо обратиться к врачу.

Чтобы не допустить ухудшения состояния и предупредить передачу инфекции, необходимо мыть руки до и после нанесения препарата, не тереть и не прикасаться к пораженным участкам кожи полотенцем.

Если Вы забыли применить мазь АКТОВИР

Нанесите мазь при первой возможности, однако предварительно убедитесь, что Вы не превышаете частоту (не более 6 раз в сутки) применения препарата.

Если Вы применили мазь больше, чем следовало

Случаи передозировки не описаны.

При непреднамеренном пероральном приеме возможны эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. Лечение симптоматическое.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, АКТОВИР может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата могут возникать следующие нежелательные реакции:

Нечасто:

- проходящее жжение или покалывание после применения мази; сухость или шелушение кожи; зуд.

Редко:

- покраснение, контактный дерматит в месте нанесения.

Очень редко:

- реакции гиперчувствительности немедленного типа, в том числе отек Квинке и кожная сыпь (крапивница).

Частота неизвестна:

- изменения активности «печеночных» ферментов (повышение уровня АЛТ).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертизы и испытаний в здравоохранении» МЗ РБ, <http://www.rceh.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата АКТОВИР

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Не применяйте препарат, если Вы заметили, что туба повреждена. Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работников аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

Одна туба 4 г содержит действующие вещества ацикловир – 100 мг, бутаминофен – 40 мг.

Вспомогательные вещества: парафин жидкий, парафин твердый, парафин мягкий белый.

Внешний вид препарата АКТОВИР и содержимое упаковки

АКТОВИР, мазь для наружного и местного применения, представляет собой мазь от белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета до светло-желтого с коричневатым или зеленоватым оттенком цвета.

По 4 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: