

Листок-вкладыш: информация для потребителя

Анузол, суппозитории ректальные 5701 - 2016

Действующие вещества: трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс (ксеноформ), красавки экстракт густой, цинка сульфата гептагидрат.

Перед применением препарата полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нём содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
 - Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.
 - Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
 - Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
 - Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 10 дней Вам следует обратиться к врачу.

Содержание данного листка:

- Что из себя представляет препарат Анузол суппозитории ректальные, и для чего его применяют
 - О чём следует знать перед применением препарата Анузол суппозитории ректальные
 - Применение препарата Анузол суппозитории ректальные
 - Возможные нежелательные реакции
 - Хранение препарата Анузол суппозитории ректальные
 - Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Анузол суппозитории ректальные, и для чего его применяют

Анузол - противогеморроидальное комбинированное средство. Обладает спазмолитическим, противовоспалительным, антисептическим, болеутоляющим, местным противовоспалительным, вяжущим и подсушивающим действием.

Показания к применению

Геморрой, трещины заднего прохода.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 10 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чём следует знать перед применением препарата Анузол суппозитории ректальные

Не применяйте препарат Анузол суппозитории ректальные:

- если у Вас аллергия (повышенная чувствительность) на действующие вещества или любые другие компоненты препарата (перечислены в разделе 6);
 - если у Вас декомпенсированная сердечная недостаточность, высокая частота сердечного ритма (тахиаритмия),
 - если у Вас слабость и патологическая утомляемость мышц (миастения),
 - если у Вас нарушение опорожнения кишечника (атония кишечника),
 - если у Вас закрытоугольная глаукома,
 - если у Вас гипертрофия предстательной железы с нарушением оттока мочи,
 - при беременности,



- в период грудного вскармливания,
- у детей в возрасте до 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Анузол суппозитории ректальные обратитесь за консультацией к врачу или работнику аптеки.

СОГЛАСОВАНО
 МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 Приказ Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь

Если имеющиеся симптомы заболевания не уменьшаются в процессе лечения или отмечается появление новых необычных ощущений, следует обратиться к врачу.

С осторожностью следует применять препарат при вегетативной нейропатии, гипертриеозе, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, митральном стенозе, заболеваниях почек, грыже пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагите, повышении температуры тела (вероятность развития лихорадки и теплового удара вследствие подавления активности потовых желез).

Дети и подростки

Применение препарата у детей в возрасте до 12 лет противопоказано.

Другие препараты и препарат Анузол суппозитории ректальные

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие лекарства, в том числе безрецептурного отпуска.

При одновременном применении с препаратами против депрессии могут усиливаться сухость во рту, нарушение зрения, учащённое сердцебиение, запор.

При применении с препаратами, повышающими частоту сердечных сокращений (в том числе прокаинамид) – возможна выраженная тахикардия (учащённое сердцебиение).

Суппозитории Анузол не следует применять одновременно с ингибиторамиmonoаминоксидазы (определенные лекарства, применяемые для лечения депрессии) и сердечными гликозидами (препараты растительного происхождения для лечения сердечной недостаточности).

Применение препарата Анузол вместе с продуктами питания, напитками и алкоголем

Не рекомендуется употребление алкоголя во время лечения препаратом Анузол.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, Вам не следует применять данный препарат.

В случае необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Поскольку при применении препарата могут возникнуть головокружение, сонливость и нарушение зрения, в период лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами.

3. Применение препарата Анузол суппозитории ректальные

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат применяют ректально, после очистительной клизмы или самостоятельного опорожнения кишечника.

Взрослым и детям старше 12 лет по 1 суппозиторию 1-3 раза в сутки.

Максимальная суточная доза препарата - 7 суппозиториев.



Длительность курса лечения составляет 10-14 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Если Вы применили препарата больше, чем следовало Министерства здравоохранения
Передозировка препарата может сопровождаться ~~тошнотой, лихорадкой~~ возбуждением, судорогами, задержкой мочеиспускания, снижением потоотделения, повышением температуры.

В случае передозировки следует немедленно прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

При наличии вопросов по применению данного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Побочные эффекты с неизвестной частотой (исходя из имеющихся данных частоту определить невозможно):

сухость во рту, жажда, запор, диарея, учащённое сердцебиение (тахикардия), выраженное сердцебиение, расширение зрачка, нарушение зрения, головная боль, головокружение, нарушение сна, сонливость, аллергические реакции, жжение в области заднего прохода.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Товарищеский пер., 2а, г. Минск, 220037

+375-17-299-55-14

www.rceth.by

5. Хранение препарата Анузол суппозитории ректальные

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и контурной ячейковой упаковке после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Не выбрасывайте лекарственные препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Анузол суппозитории ректальные содержит

Действующими веществами являются трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс (ксероформ), красавки экстракт густой, цинка сульфата гептагидрат.

Каждый суппозиторий содержит: трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс



5701 - 2016

(ксероформ) – 100 мг, красавки экстракт густой – 20 мг (5 – 9:1, Экстрагент – этанол 70 %, с содержанием суммы алкалоидов в пересчете на гиосциамин 1,5 % - 0,3 мг), цинка сульфата гептагидрат – 50 мг.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: глицерол, вода очищенная, моноглицериды дистиллированные, жир твердый (витенсбл (марки Н 15, W 35) или суппосир (марки НА 15, NAS 50)).

ГОСТ 160 (Марки Н 15, W 35)
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения

Рекомендованное содержимое упаковки

Внешний вид препарата Анузол суппозитории ректальные и суппозитории ректальные

Суппозитории ректальные.

Суппозитории торпедообразной формы зеленовато-желтого, или зеленовато-желтого с коричневым оттенком, или светло-коричневого цвета с характерным запахом.

Допускается появление белого налета на поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной, ламинированной полиэтиленом. По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку из картона.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АО «Нижфарм», Россия

ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603950

Все претензии потребителей направлять представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

АО «Нижфарм», Россия

ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603950

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

