

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
от 02.09.2020 № 896

## ЛИСТОК – В КЛАДЫШ по медицинскому применению лекарственного средства

### ДИАЛАКТ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для приема внутрь

**Название лекарственного средства.** Диалакт.

**Форма выпуска.** порошок лиофилизированный для приготовления раствора для приема внутрь.

**Общая характеристика.** Пористая масса кремовато-белого цвета со специфическим запахом и вкусом, без посторонних примесей.

**Состав на 1 флакон.**

5 доз лекарственного средства.

1 доза лекарственного средства содержит:

лиофилизированных в среде культивирования жизнеспособных бактерий штамма *Lactobacillus acidophilus* Ke-10 - не менее  $10^8$  КОЕ.

Среда культивирования состоит из молока сухого обезжиренного, воды очищенной, натрия лимоннокислого 5,5-водного.

**Фармакотерапевтическая группа.** Противодиарейные средства биологического происхождения. Препараты, содержащие микроорганизмы, продуцирующие молочную кислоту.

**Фармакологические свойства.**

Терапевтический эффект Диалакта определяют содержащиеся в нем живые лактобактерии, обладающие антагонистической активностью широкого спектра действия против патогенных и условнопатогенных микроорганизмов. Диалакт оказывает нормализующее действие на желудочно-кишечный тракт, улучшает обменные процессы, препятствует развитию длительных кишечных дисфункций.

**Показания к применению.**


Профилактика и поддерживающее лечение диареи, вызванной вирусными и бактериальными инфекциями желудочно-кишечного тракта, у младенцев, детей и взрослых. Диарея путешественников. Диарея, сопровождающая применение антибиотиков широкого спектра действия и химиотерапевтических средств. Диарея, сопровождающая лучевую терапию в области брюшной полости и органов малого таза. При острых и хронических заболеваниях толстого и тонкого кишечника (колиты, энтероколиты), протекающих на фоне дисбионаза кишечной микрофлоры.

**Способ применения и дозировка.**

Размер суточной дозы и продолжительность лечения больных определяет врач, в зависимости от возраста, тяжести, длительности и выраженности заболевания.

Диалакт применяют при кишечных заболеваниях перорально. Содержимое флакона (5 доз) растворяют кипяченой водой комнатной температуры при встряхивании из расчета 1 чайная ложка на 1 дозу лекарственного средства.

Необходимое количество доз (соответственно чайных ложек) выпивают за 20-30 минут до еды. Грудным детям лекарственное средство можно давать непосредственно перед кормлением или во время кормления.



### При кишечных заболеваниях:

- новорожденным группы «риска» с первых суток жизни назначают по 1- 2 дозы на прием 3 раза в день;
- детям первого полугодия жизни - по 3 дозы на прием 3 раза в день;
- детям второго полугодия и старше - по 5 доз 2-3 раза в день;
- детям при сепсисе, пневмонии и других гнойно-инфекционных заболеваниях - по 2-3 дозы 3 раза в день в комплексе с общепринятыми методами лечения основного заболевания. При возникновении у данной группы детей нарушений функций желудочно-кишечного тракта и угрозы язвенно-некротического энтероколита кратность введения Диалакта увеличивают до 10 раз в сутки;
- взрослым при острых хронических воспалительных заболеваниях тонкого и толстого кишечника, колитах и энтероколитах рекомендуется принимать по 5 доз 2-3 раза в день. Длительность курса лечения Диалактом определяется тяжестью клинических проявлений, с возрастом больного и составляет 2-4 недели, а в отдельных случаях - до 3-х месяцев. С профилактической целью назначают по 5 доз 1-2 раза в день в течение 1-2 недель.

### **Побочное действие.**

Аллергические реакции.

### **Противопоказания.**

Гиперчувствительность, кандидоз.

### **Передозировка.**

В настоящее время о случаях передозировки лекарственным средством не сообщалось.

### **Меры предосторожности.**

Не следует принимать Диалакт одновременно с алкоголем. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед приемом если у Вас:

- температура тела выше 38 °C;
- острыя боль в животе;
- следы крови или слизи в стуле;
- диарея длится более двух дней и сопровождается сильными болями в животе; обезвоживанием и потерей веса;
- хронические заболевания: сахарный диабет, СПИД.

Рекомендуется адекватная пероральная регидратация. Необходимо придерживаться щадящей диеты, исключить из рациона свежие овощи, фрукты, продукты, содержащие большое количество клетчатки.

### **Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.**

Не влияет.

### **Применение при беременности и кормлении грудью.**

Разрешено применение женщинам в период беременности и кормления грудью.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Лекарственное взаимодействие Диалакта не описано.

### **Условия и срок хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 °C до 8 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

1 год. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Без рецепта врача.

### **Упаковка**

5 доз во флаконе в упаковке № 10, № 5x2 с листком-вкладышем.

### **Производитель.**

СОАО «Ферайн», Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52 а,  
тел./факс: +375 17 222-92-18, тел.: +375 17 213-16-37, +375 17 213-12-58,  
e-mail: ferein\_by@mail.ru, www.ferane.by.