

Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ
MENTHAE PIPERITAE FOLIA

Регистрационный номер: _____

Форма выпуска
Порошок крупный

Общая характеристика

Кусочки листьев различной формы с заметными под лупой (10 х) блестящими золотисто-желтыми или более темными эфирномасличными железками и редкими прижатыми простыми волосками вдоль жилок, проходящие сквозь сито с номинальным размером отверстия 2000 мкм. Цвет от светло-зеленого до коричневато-зеленого с возможным присутствием буровато-коричневых и белых (стебель) вкраплений. Запах сильный, ароматный.

Листья мяты перечной содержат флавоноиды, эфирное масло, каротиноиды и другие биологически активные вещества.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие средства для устранения тошноты.

Фармакологические свойства

Водные извлечения листьев мяты перечной оказывают спазмолитическое и желчегонное действие, снижают тонус нижнего пищеводного сфинктера.

Показания к применению

Внутрь: симптоматическое лечение функциональных расстройств пищеварительного тракта (диспепсия, тошнота, метеоризм).

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к веществам, содержащимся в лекарственном средстве, а также к ментолу. Выраженная артериальная гипотензия, холелитиаз; беременность, период лактации, детский возраст до 4 лет.

Способ применения и дозы

1 фильтр-пакет помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипящей воды, закрывают крышкой и настаивают 15 мин. Фильтр-пакет отжимают.

Принимают внутрь в теплом виде: взрослые и дети от 12 до 18 лет - по 1/2 стакана водного извлечения 3 раза в сутки за 15-20 минут до еды. Дети от 4 до 12 лет - по 1/3 стакана водного извлечения 3 раза в сутки за 15-20 минут до еды.

Перед употреблением водное извлечение рекомендуется взбалтывать. Водное извлечение использовать свежеприготовленным.

Продолжительность лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от « 14 » 04 2011 г. № 394

КЛС № 2 от « 16 » 03 2011 г.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Вследствие гастроэзофагеального рефлюкса может усиливаться изжога. У пациентов с холелитиазом лекарственное средство может вызвать желчную колику. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

БЕЛОРУССИИ И ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

Меры предосторожности

Пациентам с заболеваниями печени, желчнокаменной желчевыводящих путей перед приемом лекарственного средства необходимо обратиться к врачу. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния необходимо обратиться к врачу.

Пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом не рекомендован прием лекарственного средства из-за возможного усиления изжоги.

Применение в период беременности и лактации

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами

Исследования не проводились. В связи с возможным седативным эффектом во время лечения не рекомендовано управлять автомобилем и работать с механизмами.

Применение у детей

Прием препаратов мяты перечной детям до 4 лет не рекомендован в связи с отсутствием достаточных данных.

Передозировка

При передозировке возможно развитие бронхоспазма, нарушения дыхания, появление боли в области сердца. В случае возникновения симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Информация отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия и сроки хранения

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °C.

Водное извлечение использовать свежеприготовленным.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Упаковка

По 1,2 г в фильтр-пакетах в пачке картонной № 20. Листок-вкладыш (информация для пациента), вкладывается в пачку.

Производитель: ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12,
www.padiss.by.