


ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ**(ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ)**

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Сенны листья**порошок крупный 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пачке****Sennae folium**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат «Сенны листья», и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата «Сенны листья».
3. Применение препарата «Сенны листья».
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата «Сенны листья».
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ «СЕННЫ ЛИСТЬЯ» И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Сенны листья содержат гидроксиантраценовые гликозиды (алоэ-эмодин, сеннозиды А и В), растительные слизи и другие биологически активные вещества.

1.1. Фармакотерапевтическая группа.

Слабительные средства контактного действия.

1.2. Показания к применению.

Кратковременное применение при случайных запорах.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА «СЕННЫ ЛИСТЬЯ»

2.1. Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет. Спастический запор, спастический колит, стеноз и атония кишечника, кишечная непроходимость, боли в животе неясного генеза, ущемленная грыжа, воспалительные заболевания брюшной полости (язвенный колит, болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника, энтерит, колит, аппендицит, перитонит), прободная язва, желудочно-кишечные и маточные кровотечения, нарушения водно-электролитного обмена, нарушение функции почек, цистит, панкреатит, проктит и геморрой в фазе обострения, трещины прямой кишки.

2.2. Особые указания и меры предосторожности.

Перед началом лечения проконсультируйтесь с врачом. Во избежание привыкания, препараты сенны следует чередовать с другими слабительными средствами. Лекарственное средство противопоказано пациентам с нарушениями функции почек из-за возможных электролитных нарушений. Пациенты, принимающие сердечные гликозиды, антиаритмические средства, лекарственные средства, вызывающие удлинение интервала QT, диуретики, кортикостероиды или корень солодки перед приемом лекарственного средства должны проконсультироваться с врачом. Лекарственное средство не должно приниматься более 2 недель.

в связи с риском развития электролитного дисбаланса. Длительный прием может привести к дисфункции толстой кишки (атонии) и усугублению запора.

После приема лекарственного средства моча может приобретать желто-коричневый или красно-коричневый цвет.

При длительном применении может развиваться пигментация слизистой оболочки толстой кишки (псевдомеланоз), которая обычно проходит после прекращения приема лекарственного средства. Кровотечение из прямой кишки или отсутствие дефекации после приема слабительного средства может указывать на наличие серьезного заболевания.

Если симптомы сохраняются на фоне приема лекарственного средства или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

2.3. Дети и подростки.

В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 12 лет не рекомендуется. Перед применением у детей старше 12 лет необходима консультация врача.

2.4. Другие препараты и препарат «Сенны листья».

Ускорение транзита кишечного содержимого может привести к снижению всасывания принимаемых внутрь лекарственных средств. Электролитный дисбаланс (гипокалиемия) может влиять на эффекты сердечных гликозидов, антиаритмических средств (например, хинидина) и лекарственных средств, вызывающих удлинение интервала QT. Одновременное применение диуретиков, кортикостероидов, корня солодки повышает вероятность развития электролитных нарушений.

2.5. Беременность, грудное вскармливание и фертильность.

В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

2.6. Управление транспортными средствами и работа с механизмами.

Исследования не проводились.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «СЕННЫ ЛИСТЬЯ»

3.1. Рекомендации по применению.

1 фильтр-пакет помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипящей воды, закрывают крышкой и настаивают до полного охлаждения. Фильтр-пакет отжимают.

Свежеприготовленное водное извлечение (чай) принимать внутрь по 1 стакану на ночь.

Рекомендовано принимать наименьшую дозу, достаточную для достижения необходимого эффекта, не более 2-3 раз в неделю. Не рекомендовано применять лекарственное средство более одной недели.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства. Использование лекарственного средства более 1-2 недель, требует медицинского наблюдения.

3.2. Применение у детей.

Детям старше 12 лет, по рекомендации врача, в зависимости от возраста принимать внутрь по 1/4-1/2 стакана на ночь. Принимать препарат детям до 12 лет противопоказано.

3.3. Если вы применили препарата «Сенны листья» больше, чем следовало.

Основные симптомы передозировки - боль в животе и сильная диарея с последующей потерей жидкости и электролитов. Диарея может привести к гипокалиемии, сердечным расстройствам и мышечной слабости, особенно при сопутствующем приеме сердечных гликозидов, диуретиков, кортикостероидов или препаратов корня солодки. Лечение передозировки должно включать возмещение потери жидкости и электролитов. Следует контролировать электролиты крови, особенно калий, что особенно важно у лиц пожилого возраста. При длительном применении больших доз может развиваться токсический гепатит.

3.4. Если вы забыли применить препарат «Сенны листья».

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенный прием лекарственного средства.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

4.1. Нежелательные реакции.

Возможны аллергические реакции (зуд, крапивница, сыпь), дискомфорт, боли в животе спастического характера, диспепсия, метеоризм, тенезмы, жидкий водянистый стул. В случае передозировки могут развиваться нарушения водно-электролитного баланса, альбуминурия, гематурия. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

4.2. Сообщение о нежелательных реакциях.

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, в том числе не указанные в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «СЕННЫ ЛИСТЬЯ»

Храните препарат в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C-25°C. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

Срок годности: 3 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

6.1. Полное перечисление действующих веществ.

Сенны листья

6.2. Внешний вид «Сенны листья» и содержимое упаковки.

Упаковка: по 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пачке картонной. В пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Внешний вид: кусочки хрупких листочков (редко бутонов, цветков, плодов, черешков) различной формы, проходящие сквозь сито (2000). Цвет порошка серовато-зеленый, желтовато-зеленый или коричневатозеленый. Возможны желтые вкрапления.

6.3. Держатель регистрационного удостоверения и производитель.

ООО «НПК Биотест», Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. +375 152 68-45-79.

Сайт: www.biotest.by

Листок-вкладыш пересмотрен:

22.02.2021

