


01.09.2016


ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Торговое название лекарственного средства

Тонзилгон® Н

Лекарственная форма

таблетки, покрытые оболочкой

Состав

1 таблетка содержит измельченное лекарственное растительное сырье (порошок) из:

Травы одуванчика лекарственного (Taraxaci herba)	4 мг
Травы хвоща (Equiseti herba)	10 мг
Корня алтея (Althaeae radix)	8 мг
Цветков ромашки (Matricariae flores)	6 мг
Коры дуба (Quercus cortex)	4 мг
Листьев грецкого ореха (Juglandis folia)	12 мг
Травы тысячелистника (Millefolii herba)	4 мг

Вспомогательные ингредиенты: лактоза моногидрат, кукурузный крахмал, картофельный крахмал, стеариновая кислота, глюкоза моногидрат, кремния диоксид коллоидный безводный, кальция карбонат, касторовое масло, декстрин, глюкозы сироп, индигодин (Е 132), монтан гликоль воск, повидон К 25, повидон К 30, сахароза, шеллак, тальк, титана диоксид (Е 171).

Описание

круглые, двояковыпуклые светло-голубые таблетки, покрытые оболочкой с гладкой поверхностью.

Фармакологические свойства


лекарственное средство содержит в качестве действующих веществ компоненты растительного происхождения.

Показания к применению

в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся першением и болью в горле, затруднением глотания, кашлем. Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

СОГЛАСОВАНО
 МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 Приказ Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь
 от « 11 » 08 2016 № 736

кв. № 705 д.р. 07.2016



Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, к растениям семейства сложноцветных.

Меры предосторожности

пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, непереносимостью фруктозы, лактазной недостаточностью, мальабсорбцией глюкозы-галактозы, недостаточностью сахаразы-изомальтазы не следует принимать данное лекарственное средство. Одна таблетка, покрытая оболочкой, содержит около 0,02 хлебных единиц (ХЕ). Лекарственное средство противопоказано детям до 6 лет.

Если симптомы сохраняются на фоне приема лекарственного средства или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

исследования по изучению взаимодействия не проводились. На настоящий момент сведения о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют. При одновременном применении лекарственных средств, содержащих кору дуба, всасывание алкалоидов и других щелочных компонентов может снижаться или блокироваться.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью

данные о применении лекарственного средства Тонзилгон Н у беременных женщин отсутствуют или ограничены. Лекарственное средство Тонзилгон Н не рекомендуется беременным женщинам.

Данные о наличии действующих веществ или их метаболитов в грудном молоке отсутствуют. Не может быть исключен риск для детей, находящихся на грудном вскармливании. Лекарственное средство Тонзилгон Н не рекомендуется принимать женщинам, кормящим грудью. Данные о влиянии на фертильность отсутствуют.

Влияние на способность управлять автомобилем или механизмами

лекарственное средство не влияет на способность управлять автомобилем или механизмами.


Способ применения и дозировка

дети до 6 лет - лекарственное средство противопоказано,
дети в возрасте от 6 до 11 лет - в острый период развития заболевания по 1 таблетке 5–6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов по 1 таблетке 3 раза в день,
дети старше 12 лет и взрослые - в острый период развития заболевания по 2 таблетки 5–6 раз в день, после уменьшения выраженности симптомов по 2 таблетке 3 раза в день.

Применение у пациентов с нарушением функции печени и/или почек: информация отсутствует.

Способ применения.

Таблетку следует проглатывать целиком, не разжёвывая, запивая достаточным количеством воды.



Продолжительность приема.

Лекарственное средство не рекомендовано принимать более 2 недель.

Побочные эффекты

редко нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея).
Возможны аллергические реакции (сыпь, крапивница, ангионевротический отек).

При применении лекарственных средств, содержащих цветки ромашки, могут развиваться реакции гиперчувствительности у лиц с повышенной чувствительностью к растениям семейства сложноцветных (например, полынь, тысячелистник, хризантема, маргаритка) вследствие так называемых перекрестных реакций.

При появлении первых признаков аллергической реакции следует прекратить применение лекарственного средства Тонзилгон® Н.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка

случаи передозировки описаны не были.

В случае употребления лекарственного средства в дозах, превышающих терапевтические, необходимо проводить симптоматическое лечение.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

хранить при температуре не выше 30 °С . В недоступном для детей месте.

Форма выпуска

по 25 таблеток в блистер. По 2 или 4 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную коробку.

Условия отпуска из аптек

без рецепта

Производитель

БИОНОРИКА СЕ
Кершенштайнерштрассе 11-15,
92318 Ноймаркт
Германия

Представительство в Республике Беларусь
220095 г. Минск, пр. Рокоссовского 64, пом.2 Н
тел/факс (+375 17) 211-40-08, 211-40-13
e-mail office@bionorica.by