


Инструкция по медицинскому применению
СЕПТИЛИН (SEPTILIN) таблетки

НД РБ
7500 - 2020

Регистрационный номер

Торговое название препарата
Септилин

Лекарственная форма
Таблетки



Состав

Порошки:	Balsamodendron mukul	Коммифора мукул (смесь масла, камеди и смолы)	: 324 мг
	Shankh bhasma	Шанкх басма (зола)	: 64 мг
Экстракты:	Maharasnadi quath	Махараснади кват* (многокомпонентная растительная смесь)	: 130 мг
	Tinospora cordifolia	Тиноспоры сердцелистной стебли	: 98 мг
	Rubia cordifolia	Марены сердцелистной корни	: 64 мг
	Emblica officinalis	Эмблики лекарственной плоды	: 32 мг
	Moringa pterygosperma	Моринги крылатосеменной листья	: 32 мг
	Glycyrrhiza glabra	Солодки голой корни	: 12 мг

- * В состав 130 мг многокомпонентной растительной смеси «Махараснади кват» входят:
- терминалии чебули плоды - Terminalia chebula (Combretaceae) 30,654 мг;
 - терминалии беллерики плоды - Terminalia bellerica (Combretaceae) 30,654 мг;
 - эмблики лекарственной плоды - Emblica officinalis (Euphorbiaceae) 30,654 мг;
 - фагонии критской целое растение - Fagonia cretica (Zygophyllaceae) 1,729 мг;
 - сиды сердцелистной корень - Sida cordifolia (Malvaceae) 1,729 мг;
 - клещевины обыкновенной корень - Ricinus communis (Euphorbiaceae) 1,729 мг;
 - кедра гималайского древесина - Cedrus deodara (Roxb.ex Lamb.)G.Don (Pinaceae) 1,729 мг;
 - гедихия колоскового корневища - Hedychium spicatum (Zingiberaceae) 1,729 мг;
 - адатоды настоящей корни - Adhatoda vasica (Acanthaceae) 1,729 мг;
 - имбиря лекарственного корневища - Zingiber officinale (Zingiberaceae) 1,729 мг;
 - перца явского длинного стебли - Piper chaba (Piperaceae) 1,729 мг ;
 - сыти круглой клубень - Cyperus rotundus (Cyperaceae) 1,729 мг;
 - берхавии раскидистой корни - Boerhaavia diffusa (Nyctaginaceae) 1,729 мг;
 - тиноспоры сердцелистной стебли - Tinospora cordifolia (Menispermaceae) 1,729 мг;
 - аргирея красивая стебель - Argyreia speciosa (Convolvulaceae) 1,729 мг;
 - укропа индийского семена - Anethum sowa Roxb. ex Flem. (Apiaceae) 1,729 мг;
 - якорцев стелющихся плоды - Tribulus terrestris (Zygophyllaceae) 1,729 мг;
 - витании снотворной корни - Withania somnifera (Solanaceae) 1,729 мг;
 - кассии дудчатой плод - Cassia fistula (Fabaceae) 1,729 мг;
 - спаржи кистевидной корни - Asparagus racemosus Willd. (Liliaceae) 1,729 мг;
 - перца длинного плоды - Piper longum (Piperaceae) 1,729 мг;
 - барлерии пильчатой целое растение - Barleria prionitis (Acanthaceae) 1,729 мг;

- кориандра посевного семена - *Coriandrum sativum* (Apiaceae) 1,729 мг;
- паслена желтоплодного целое растение - *Solanum xanthocarpum* (Solanaceae) 1,729 мг;
- паслена индийского целое растение - *Solanum indicum* (Solanaceae) 1,729 мг.

Вспомогательные вещества: магния стеарат, микрокристаллическая целлюлоза, кросповидон, натрия кармеллоза, кремния диоксид коллоидный.

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки без оболочки зеленовато-коричневого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие лекарственные средства.

Аюрведическое лекарственное средство.

Код АТХ: V03A.

Фармакологические свойства

Многокомпонентное аюрведическое средство. Оказывает противовоспалительное действие. В экспериментальных исследованиях получены данные о возможном влиянии препарата на клеточные и гуморальные механизмы неспецифической резистентности. Механизм действия не установлен. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров аюрведических средств невозможно.

Показания к применению

В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (острый риносинусит, обострение хронического риносинусита, обострение хронического тонзиллофарингита).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата.
Детский возраст до 18 лет, беременность, период лактации.

Способ применения и дозы

Внутрь. По 2 таблетки 2 раза в день в течение 10-14 дней. В случае неполного купирования симптомов заболевания, лечение может быть продолжено до 4 недель в дозе по 1 таблетке 2 раза в день или по усмотрению врача.

В случае появления нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта доза препарата может быть снижена до 1 таблетки 2 раза в день. В случае, если снижение дозы не приводит к купированию симптомов, рекомендуется отмена препарата.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, ощущение сухости во рту, диспепсические явления (тошнота, диарея, метеоризм), абдоминальные боли, транзиторное повышение активности «печеночных» трансаминаз.

При возникновении побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно применение в составе комплексной терапии с антибактериальными препаратами.

Корень солодки, входящий в состав препарата, может препятствовать действию антигипертензивных средств. При одновременном применении с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, кортикостероидами и слабительными средствами возможно усиление гипокалиемии, совместный прием с данными средствами не рекомендован.

Особые указания

Препарат с осторожностью назначают пациентам с заболеваниями печени и/или почек, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипокалиемией, декомпенсацией сердечной деятельности.

Если во время приема препарата симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (развивается нарушение дыхания, повышается температура, появляется кашель с гнойной мокротой), необходимо обратиться к врачу.

Применение в педиатрии

Препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет.

Применение препарата во время беременности и лактации

Применение препарата противопоказано во время беременности и лактации.

Влияние на способность к вождению автотранспорта, управлению механизмами

О влиянии препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и прочими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера/оператора и другое) не сообщалось.

Передозировка

Сообщения о случаях передозировки отсутствуют.

Симптомами передозировки корня солодки являются задержка жидкости в организме, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая энцефалопатия.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Форма выпуска

По 60 таблеток во флаконы. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

В сухом, недоступном для детей месте, при температуре от + 10 до + 30 °С.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Производитель

"Хималайя Драг Ко", Макали, Бангалор 562 162, Индия.

