


Листок-вкладыш
(информация для пациента)

БОЯРЫШНИКА ПЛОДЫ

Crataegi fructus



МНН. Отсутствует.

Регистрационный номер _____

Боярышника плоды содержат флавоноиды (гиперозид, рутин, кверцетин, витексин), органические кислоты (урсоловая, олеаноловая, хлорогеновая, кофейная), дубильные вещества, жирные масла, пектины, сахара, витамины и другие биологически активные вещества.

Состав. Боярышника плоды, цельное сырье.

Форма выпуска. Цельное сырье 50 г и 100 г в пачке.

Фармакологические свойства. Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах боярышника, оказывают умеренное кардиотоническое, гипотензивное и седативное действие.

Показания к применению. В комплексной терапии функциональных нарушений сердечно-сосудистой деятельности.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания. Гиперчувствительность, выраженная артериальная гипотензия, брадикардия; беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозировка. 15 г (1 столовая ложка) плодов помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые принимают внутрь по 1/2-1/3 стакана 2-3 раза в сутки за 30 мин до еды.

Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

Длительность лечения определяется врачом индивидуально, с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции. При длительном применении в больших дозах возможны брадикардия, сонливость, снижение артериального давления, головокружение.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка. *Симптомы:* снижение артериального давления, головокружение, сонливость, брадикардия. В случае передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

СОГЛАСОВАНО

Министерством здравоохранения
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Меры предосторожности. Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача.

Во время лечения необходим контроль артериального давления и электрокардиограммы.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу. Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности (например, одышка).

Применение при беременности и лактации. Не принимать во время беременности и кормления грудью в связи с отсутствием достаточных данных.

Применение у детей. Применение лекарственного средства у детей до 12 лет противопоказано. Применение лекарственного средства у детей в возрасте 12-18 лет возможно только по назначению врача и под медицинским наблюдением.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. При совместном назначении с сердечными гликозидами происходит усиление кардиотонического, с β -адреноблокаторами — гипотензивного действия. Не рекомендуется одновременное применение с антиаритмическими средствами, а также с цизапридом. Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования комплексов.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой – при температуре от 8 °С до 15 °С не более 2 суток.

Срок годности. 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка. По 50 г или 100 г в пачке картонной с внутренним бумажным пакетом. Предусмотрено вложение листка-вкладыша в пачку.

Производитель. ООО «Калина».

Адрес. Республика Беларусь
211019, Витебская область,
Оршанский район,
д. Пищалово
Телефон. (0216) 54-81-68