

### **АТРОПИН ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ ВР 1%**

**Состав:** м/о

Атропин сульфат ВР 1%  
Хлоробутанол ВР 0.5%

(как консервант)

Водная основа

достаточное количество (q.s.)

#### **Фармакология:**

Глазные капли атропин обладают парасимпатолитическим действием, которое включает паралич аккомодации глаза и расширение зрачка.

#### **Показания и использование:**

В качестве циклоплегического или мидриатического средства при рефракции или для желаемого расширения радужной оболочки или увеального тракта во время острых воспалительных состояний.

#### **Дозировка и administration:**

**Взрослые:**

Воспаление глаз (увеит/ирит): закапывать в глаз(а) по 1 или 2 капли максимум 4 раза в день.

Заболевание глаз, которое может вызвать нечеткость зрения (рефракцию): закапать 1 или 2 капли в глаз(а) за час до обследования.

**Дети:**

Воспаление глаз (увеит/ирит): по 1 капле в каждый глаз, максимум 3 раза в день. Заболевания глаз, которые могут вызвать нечеткость зрения (рефракцию): по 1 капле в каждый глаз два раза в день за 1-3 дня до обследования

#### **Противопоказания:**

Не применять при глаукоме или склонности к глаукоме, а также у лиц с повышенной чувствительностью к алкалоидам белладонны. Не следует использовать детям в возрасте до шести лет.

#### **Предупреждения и меры предосторожности:**

**ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ.**  
Используйте раствор в течение одного месяца после открытия флакона.

Его следует применять с осторожностью у пациентов, у которых возможно повышенное внутриглазное давление. Пациентов следует предупредить, что антимускариновые глазные капли временно ухудшают зрение.

**Побочные эффекты:**

У пациентов может возникнуть светобоязнь, поэтому глаза следует защищать от яркого света, пока зрачки расширены.

Длительное применение глазных капель с атропином может привести к местному раздражению, переходящему в жжение, гиперемии, отеку и конъюнктивиту. Может наблюдаться повышение внутриглазного давления, особенно у пациентов с закрытоугольной глаукомой.

Гиперчувствительность к атропину не является редкостью и может проявляться в виде кожной сыпи или конъюнктивита.

Закапывание глазных капель может вызвать системную токсичность, особенно у младенцев и пожилых людей. Сообщаемые симптомы включают тяжелую атаксию, беспокойство, возбуждение и галлюцинации.

Другие побочные эффекты могут включать сухость во рту с затруднением глотания и разговора, гиперемию и сухость кожи, переходящую в брадикардию с последующей тахикардией, сердцебиение и аритмии, снижение секреции бронхов, позывы к мочеиспусканию, задержку и запор.

**Хранение:**

Хранить в прохладном и темном месте. Не замораживать.

**Упаковка:**

Стерильный пластиковый флакон.

Производственная лицензия No.G/476

Произведено в Индии:

**SUNWAYS RONTO  
PHARMACEUTICAL  
PVT.LTD.**

803/4/5, GIDC, Дхолка,  
Ахмедабад-382 225.