

НД РБ

1755Б-2018

**Листок-вкладыш – информация для потребителя
ЛЕЙАРГУНАЛ,**

400 мг/1000 мг/600 мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь
Действующие вещества: инозин, L-лейцин, L-аргинина гидрохлорид

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат ЛЕЙАРГУНАЛ, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата ЛЕЙАРГУНАЛ
3. Прием препарата ЛЕЙАРГУНАЛ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ЛЕЙАРГУНАЛ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат ЛЕЙАРГУНАЛ,
и для чего его применяют**

ЛЕЙАРГУНАЛ является комбинированным препаратом и относится к группе препаратов, которые называются иммуностимуляторами.


Применяется в составе комплексной терапии следующих состояний у взрослых:

- хронический периодонтит;
- пневмония затяжного течения и хронический бронхит.

**2. О чем следует знать перед приемом
препарата ЛЕЙАРГУНАЛ**

Не принимайте препарат ЛЕЙАРГУНАЛ:

- если у вас аллергия на инозин, лейцин, аргинин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- в постинфарктном периоде;
- если у вас ревматическое заболевание системного характера, причиной которого является повышенное содержание мочевой кислоты в крови (подагра);
- если у вас повышенное содержание мочевой кислоты в крови (гиперурикемия);
- если у вас есть серьезные нарушения функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин);
- если у вас обострение заболеваний, вызванных вирусом простого герпеса;



- если у вас хроническое психическое заболевание (шизофрения);
- в период беременности и кормления грудью;
- в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата ЛЕЙАРГУНАЛ проконсультируйтесь с лечащим врачом. Препарат ЛЕЙАРГУНАЛ с осторожностью назначают при нарушениях функции почек (клиренс креатинина >30 мл/мин).

Особые указания и меры предосторожности, связанные с наличием инозина

Во время приема препарата ваш врач будет назначать вам необходимые анализы для контроля уровня мочевого кислоты в крови и моче.

При появлении зуда и покраснения кожи необходимо прекратить прием препарата.

Особые указания и меры предосторожности, связанные с наличием аргинина

Препарат ЛЕЙАРГУНАЛ следует с осторожностью принимать пациентам с анурией (полное прекращение выделения мочи в мочевой пузырь).

Наблюдалось повышение концентрации калия в плазме крови у пациентов с уремией.

Ваш лечащий врач будет регулярно назначать вам необходимые анализы для проверки рН плазмы и уровня хлоридов.

Препарат ЛЕЙАРГУНАЛ не следует принимать пациентам с аллергией.

Аргинин следует с осторожностью назначать пациентам с гиперхлоремическим ацидозом.

Дети

Противопоказано применение у детей и подростков младше 18 лет.

Другие препараты и препарат ЛЕЙАРГУНАЛ

Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые вы купили без предписания.

ЛЕЙАРГУНАЛ при одновременном применении ослабляет:

- бронхолитический эффект теofilлина;
- психостимулирующее действие кофеина.

Связанные с наличием инозина

При совместном применении с другими лекарственными препаратами возможно:

- с гепарином – усиление эффектов гепарина, увеличение продолжительности его действия;
- с сердечными гликозидами – предупреждение возникновения аритмий, усиление положительного инотропного действия;
- с гипоурикемическими препаратами – ослабление эффектов гипоурикемических препаратов.

При одновременном применении с β -адреноблокаторами эффект инозина не уменьшается.

Возможно одновременное применение с нитроглицерином, нифедипином, фуросемидом.


Связанные с наличием аргинина

Не следует принимать аргинин совместно со:

- спиронолактоном, из-за риска развития тяжелой, потенциально летальной гиперкалиемии;
- калийсберегающими диуретиками, из-за повышенного риска развития аргинин-индуцированной гиперкалиемии.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.



Данные о применении препарата ЛЕЙАРГУНАЛ у беременных женщин отсутствуют. Применение препарата ЛЕЙАРГУНАЛ противопоказано во время беременности (см. раздел «О чем следует знать перед приемом препарата ЛЕЙАРГУНАЛ»).

Кормление грудью

Противопоказано применение в период грудного вскармливания (см. раздел «О чем следует знать перед приемом препарата ЛЕЙАРГУНАЛ»). В период лечения препаратом ЛЕЙАРГУНАЛ грудное вскармливание следует прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

ЛЕЙАРГУНАЛ не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами.

3. Прием препарата ЛЕЙАРГУНАЛ

Всегда принимайте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений, посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

В составе комплексной терапии у взрослых

Хронический периодонтит

По 1 пакету 1 раз в день.

Курс лечения – 21 день.

При необходимости повторные курсы приема через 3-6 месяцев.

Пневмония затяжного течения и хронический бронхит

По 1 пакету 1 раз в день.

Курс лечения – 21 день.

При необходимости повторные курсы приема через 3-6 месяцев.

Особые группы пациентов

Дети

Противопоказан у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Пациенты с почечной недостаточностью

Противопоказан у пациентов с почечной недостаточностью. При нарушениях функции почек назначают с осторожностью.

Способ применения

Для приема внутрь. Принимают после еды, содержимое пакета растворяют при помешивании в 1 стакане теплой кипяченой воды.

Если вы приняли препарата ЛЕЙАРГУНАЛ больше, чем следовало

При приеме в рекомендуемых дозах как острое, так и хроническое отравление маловероятно.

Если вы пропустили прием препарата ЛЕЙАРГУНАЛ

Если вы пропустили прием препарата, не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.


При наличии дополнительных вопросов по применению данного препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, ЛЕЙАРГУНАЛ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- головная боль;
- обострение подагры;
- повышение уровня мочевой кислоты в крови;
- аллергические реакции, крапивница, кожный зуд, покраснение кожи (требуется



отмена препарата).

Нежелательные реакции, связанные с наличием инозина

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические/анафилактические реакции, включая высыпания, зуд, гиперемия кожи, крапивницу, анафилактический шок;
- обострение подагры (при продолжительном применении высоких доз);
- тахикардия;
- артериальная гипотензия;
- головная боль;
- головокружение;
- одышка;
- тошнота;
- рвота;
- потливость;
- общая слабость;
- повышение уровня мочевой кислоты в крови.

Нежелательные реакции, связанные с наличием лейцина

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- реакции гиперчувствительности, включая сыпь, кожный зуд.

Нежелательные реакции, связанные с наличием аргинина

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- головная боль;
- тошнота, рвота;
- снижение количества тромбоцитов;
- реакции гиперчувствительности, включая сыпь, анафилаксия (следует прекратить применение);
- гематурия (наличие крови в моче) (возможно развитие через 1-2 дня после приема аргинина).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ЛЕЙАРГУНАЛ

Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Один пакет содержит: *действующие вещества*: инозин – 400 мг, L-лейцин – 1000 мг, L-аргинина гидрохлорид – 600 мг; *вспомогательные вещества*: метилцеллюлоза, кальция

НД РБ

1755Б-2018



стеарат.

Внешний вид препарата ЛЕЙАРГУНАЛ и содержимое упаковки

ЛЕЙАРГУНАЛ, порошок для приготовления раствора для приема внутрь. Смесь порошка и мелких гранул белого или почти белого цвета.

По 2016 мг в пакеты из ленты упаковочной из материала комбинированного на основе бумаги (бумага/полиэтилен) или на основе фольги алюминиевой (бумага/полиэтилен/фольга/полиэтилен).

10 пакетов вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Условия отпуска: по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс:(+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен: