


**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
**по медицинскому применению лекарственного средства**  
**МАГНЕФАР В<sub>6</sub> БИОФАРМ**

*Прочитайте внимательно листок-вкладыш перед применением лекарственного средства. Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочитать его заново. Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к врачу.*

**Торговое название:** МАГНЕФАР В<sub>6</sub> БИОФАРМ

**Международное непатентованное название:** отсутствует

**Лекарственная форма:** таблетки



**Описание**

Продолговатые двояковыпуклые таблетки, белого цвета, с гладкой поверхностью, с риской на одной стороне.

Риска предназначена для облегчения разламывания таблетки при возникновении затруднений при её проглатывании целиком.

**Состав**

*Каждая таблетка содержит:*

*действующие вещества:* магния гидроаспарагината тетрагидрат 500 мг, что соответствует 34 мг ионов магния, и пиридоксина гидрохлорид (витамин В<sub>6</sub>) 5 мг.

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, гипромелоза.

**Фармакотерапевтическая группа**

Минеральные добавки. Прочие минеральные добавки. Средства на основе магния.

Код АТС: A 12 CC

**Показания для применения**

Лечение подтверждённого дефицита магния в организме – как изолированного, так и ассоциированного с другими дефицитными состояниями.

Комбинация определённого числа следующих симптомов может свидетельствовать о дефиците магния:

- нервозность, раздражительность, слабая тревога, преходящая усталость, небольшие нарушения сна;
- признаки тревоги, такие как желудочно-кишечные спазмы или учащённое сердцебиение (при здоровом сердце);
- мышечные судороги, ощущение покалывания.

Назначение магния может помочь снять эти симптомы.

Если после одного месяца лечения улучшения не наблюдается, продолжение монотерапии данным препаратом нецелесообразно.

**Противопоказания**

- если у пациента имеется повышенная чувствительность к магния гидроаспарагинату, пиридоксина гидрохлориду (витамины В<sub>6</sub>) или на какой-либо другой компонент этого лекарства,
- если у пациента диарея,

- если у пациента выявлена гипермагниемия (повышенная концентрация магния в крови),
- если у пациента выявлен гипервитаминоз В<sub>6</sub> (повышенная концентрация витамина В<sub>6</sub> в крови),
- если у пациента имеется тяжёлая почечная недостаточность,
- если у пациента выявлена выраженная артериальная гипотония,
- если у пациента выявлена атриовентрикулярная блокада,
- если у пациента выявлена болезнь с названием *myasthenia gravis* (приобретённая хроническая болезнь, характеризующаяся быстрой усталостью и ослаблением скелетных мышц),
- детский возраст до 6 лет.

### ***Предостережения при применении***

- лекарство не следует принимать натощак,
- не превышать рекомендованной дозы, так как это может привести к появлению диареи, что может вызвать небезопасное в своих последствиях обезвоживание организма,
- при длительном применении лекарства необходимо контролировать концентрацию магния в плазме.

В случае сопутствующего дефицита кальция, дефицит магния должен быть устранен до начала введения дополнительного приема кальция.

С осторожностью принимать с гликозидами наперстянки (назначаемыми при сердечной недостаточности). Данная лекарственная форма не назначается детям до 6 лет.

### ***Лекарственное взаимодействие и другие виды взаимодействия***

#### Противопоказанные комбинации

С леводопой: активность леводопы ингибитируется пиридоксином (если приём этого препарата не сочетается с приёмом ингибиторов периферической декарбоксилазы ароматических L-аминокислот). Следует избегать приёма любого количества пиридоксина, если леводопа не принимается в сочетании с ингибиторами периферической декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

#### Нерекомендуемые комбинации

Одновременное применение препаратов, содержащих фосфаты или соли кальция, может ухудшать всасывание магния в кишечнике.

#### Комбинации, которые необходимо принимать во внимание

При назначении внутрь фторхинолонов и тетрациклических антибиотиков необходимо соблюдать интервал не менее трёх часов между приёмом внутрь их и Магнефара В<sub>6</sub> Биофарм, так как препараты магния уменьшают всасываемость тетрациклических антибиотиков и фторхинолонов.

Применение циклосерина, гидралазина, изониазида, пеницилламина приводит к снижению содержания витамина В<sub>6</sub> в организме.

Мочегонные препараты (фуросемид, этакриновая кислота) увеличивают выделение магния с мочой.

Длительно применяемые калийсберегающие мочегонные лекарственные средства, могут увеличивать реабсорбцию магния в почечных канальцах и приводить к гипермагниемии.

Другие лекарственные средства, содержащие магний, такие как слабительные и нейтрализующие желудочный сок, принимаемые одновременно с гидроаспарагинатом магния, могут вызывать симптомы отравления магнием, особенно у лиц с почечной недостаточностью.

***Беременность и период кормления грудью***

Клинический опыт применения препарата у достаточного количества беременных женщин не выявил какого-либо неблагоприятного влияния на возникновение пороков плода или фетотоксического действия. Препарат может применяться в период беременности только при необходимости, по рекомендации врача.

Магний проникает в грудное молоко. Следует избегать применения препарата в период грудного вскармливания.

***Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.***

Не влияет.

***Способ применения и дозы***

Таблетки Магнефар В<sub>6</sub> Биофар принимают внутрь после еды, запивая небольшим количеством жидкости. Разделительная линия на таблетке предназначена для разламывания таблетки с целью облегчения её проглатывания.

Взрослым рекомендуется принимать 6 – 8 таблеток в сутки.

Детям старше 6 лет (с массой тела более 20 кг) – 4 – 6 таблеток в сутки.

Суточную дозу следует разделить на 2 – 3 приёма.

Данные о максимально допустимой суточной дозе отсутствуют.

***Почекная недостаточность:***

Лекарство противопоказано пациентам с тяжёлой почечной недостаточностью.

***Печёночная недостаточность:***

Изменение дозы не требуется.

***Продолжительность лечения***

Продолжительность лечения обычно составляет один месяц.

Лечение следует прекратить сразу же после нормализации уровня магния в крови.

***Передозировка***

Симптомы передозировки редко появляются у пациентов с нормальной функцией почек. Приём лекарства в дозах, значительно превышающих рекомендованные, может вызывать: аллергические реакции, тошноту, рвоту, боли в животе, диарею и обезвоживание организма, депрессию центральной нервной системы, снижение рефлексов, нарушения на ЭКГ.

При появлении диареи необходимо уменьшить суточную дозу или временно прекратить приём лекарственного средства.

Другие симптомы передозировки: асистолия (отсутствие сердечных сокращений), брадикардия (редкое сердцебиение), сонливость, кома, гипотензия (низкое артериальное давление), паралич мышц, почечная недостаточность, нарушение дыхания.

Лечение передозировки: необходимо исключить средства, содержащие магний, поддерживать дыхание, регидратация, форсированный диурез. В случае почечной недостаточности – гемодиализ или перitoneальный диализ. Специфический антидот – глюконат кальция.

При приёме дозы большей, чем рекомендованная, необходимо немедленно обратиться к врачу.

***В случае пропуска очередного приема препарата Магнефар В<sub>6</sub> Биофарм***

Лечение следует продолжать, соблюдая указанный способ дозирования лекарства Магнефар В<sub>6</sub> Биофарм.

Не следует принимать двойной дозы с целью восполнения пропущенной.

***Побочное действие***

Как и каждое лекарство, Магнефар В<sub>6</sub> Биофарм может вызывать побочные действия, хоть и не у каждого они появляются.

Зарегистрированы следующие нежелательные реакции:

Редко – могут возникать менее, чем у 1 человека из 1 000: боли в животе, тошнота и диарея, которые, обычно, самостоятельно проходят, возможно нарушение атриовентрикулярной проводимости, покраснение кожи

Очень редко - могут возникать менее, чем у 1 человека из 10 000: аллергические реакции, включая кожные реакции

**Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

***Условия хранения***

Хранить при температуре от 15°C до 25°C, в защищенном от света и влаги месте. Хранить в недоступном для детей месте.

***Срок хранения***

3 года.

Не применять препарат по истечении его срока годности.

***Условия отпуска***

Без рецепта.

***Упаковка:***

По 10 таблеток в блистерах из фольги ПВХ/Ал. По 6 блистеров с листком-вкладышем помещают в картонные пачки.

***Информация о производителе***

БИОФАРМ®ООО,  
Познань, ул. Валбжиска 13,  
60-198 Польша,  
тел. +48 61 66 51 500